

Vogue.



Μεσοπρώιμη, γενικής χρήσης, ιδανική για όλους τους τύπους μαγειρέματος. Κατάλληλη και για θερμοκηπιακή και δεύτερη καλλιέργεια, αρκετά ανθεκτική στην ακτινομύκωση και τους νηματώδεις.

- ▶ **Κιτρινόσαρκη, με υψηλές αποδόσεις**
- ▶ **Ωραία λαμπερή εμφάνιση, μεγάλοι ομοιόμορφοι κόνδυλοι**
- ▶ **Εξαιρετική γεύση**



characteristics

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: Konst Research B.V.

Διασταύρωση: MARABEL x AMOROSA

Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2046

Σπορόφυτο: KO 03-2027

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοπρώιμη / 6,5

Χρώμα φύτρου: πρασινοκόκκινο / GR

Χρώμα άνθους: λευκό / W

Αριθμός μούρων: πολύ υψηλός / 4

Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7

Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: αρκετά καλή / 7,5

Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7

Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y

Χρώμα σάρκας: κίτρινο / Y

Εμφάνιση φλοιού: μέτρια / 6

Σχήμα κονδύλου: οβαλ μακρύ / OL

Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7

Κονδυλοποίηση: αρκετά χαμηλή / 5,5

Μέγεθος κονδύλου: μεγάλο / 8

Κανονικότητα μεγέθους: κανονικό / 7

Λήθαργος: αρκετά σύντομος / 5

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Μηχανικοί χειρισμοί: αρκετά ευαίσθητη / 6

Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Βάρος εντός νερού: 311

Στερεά ουσία: 17,3%

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): ελαφρά σφικτή / AB

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: - / -

Κατανομή στερεάς ουσίας: - / -

Ποιότητα τσιπς: ακατάλληλη / 4

How to grow

Λίπανση ¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία -10%. Κατά προτίμηση σε χωριστές εφαρμογές, η δεύτερη λίγο μετά την έναρξη κονδυλοποίησης.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία +10%.

Μεταχείριση σπόρου

Το σπάσιμο του κύριου φύτρου και η σωστή προβλάστηση είναι ιδανική μέθοδος. Εάν απαιτηθεί σπάσιμο των φύτρων, δεν πρέπει να γίνει πάνω από μία φορά, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 φυτά/10 στρ.)

35/55 mm: 27 cm (50.000 φυτά/10 στρ.)

¹ Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους

Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), δεν προκαλεί πρόβλημα στο φύλλωμα ή μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Αυστηρό προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου είναι απαραίτητο.

Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης - .

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 °C. Κατάλληλη για άμεση χρήση ή μετά από σύντομο χρόνο αποθήκευσης.



Say potato,
say **Agrico.**

Ανθεκτικότητες

Ίωση - LRV: - / -

Ίωση - Υn: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Ίωση - Υntn (κονδύλου): ευαίσθητη / 5

Ίωση- Spreaing: πολύ ευαίσθητη / 4

Περονόσπορος φύλλων: πολύ ευαίσθητη / 4

Περονόσπορος κονδύλων: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Ακτινομύκωση: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Σπογγοσπορίωση: πολύ ευαίσθητη / 2

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: πολύ ευαίσθητη / 4,5

Καρκίνωση 1: ελάχιστα ευαίσθητη / 9

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -