Vogue.

Μεσοπρώιμη, γενικής χρήσης, ιδανική για όλους τους τύπους μαγειρέματος. Κατάλληλη και για θερμοκηπιακή και δεύτερη καλλιέργεια, αρκετά ανθεκτική στην ακτινομύκωση και τους νηματώδεις.

Γενικής Χρήσης



- **Κιτρινόσαρκη, με υψηλές αποδόσεις**
- **Ωραία λαμπερή εμφάνιση, μεγάλοι ομοιόμορφοι κόνδυλοι**
- **Εξαιρετική γεύση**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: Konst Research B.V.
Διασταύρωση: MARABEL x AMOROSA
Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2046
Σπορόφυτο: KO 03-2027

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοπρώιμη / 6,5
Χρώμα φύτρου: πρασινοκόκκινο / GR
Χρώμα άνθους: λευκό / W
Αριθμός μούρων: πολύ υψηλός / 4
Φύλλωμα – αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7
Φύλλωμα – τελική ανάπτυξη: αρκετά καλή / 7,5
Φύλλωμα – ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7
Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y
Χρώμα σάρκας: κίτρινο / 7
Εμφάνιση φλοιού: μέτρια / 6
Σχήμα κονδύλου: οβαλ μακρύ / OL
Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7
Κονδυλοποίηση: αρκετά χαμηλή / 5,5
Μέγεθος κονδύλου: μεγάλο / 8
Κανονικότητα μεγέθους: κανονικό / 7
Λήθαργος: αρκετά σύντομος / 5

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6,5
Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8
Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαίσθητη / 6,5
Μηχανικοί χειρισμοί: αρκετά ευαίσθητη / 6
Q_Discolouration after frying: πολύ ευαίσθητη / 4
Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8
Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5
Βάρος εντός νερού: 311
Στερεά ουσία: 17,3%
Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): ελαφρά σφικτή / AB
Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5
Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: - / -
Κατανομή στερεάς ουσίας: - / -
Ποιότητα τσιπς: ακατάλληλη / 4

Η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ, δεν είναι υπεύθυνοι για ζημιές σχετιζόμενες με τη χρήση των πληροφοριών του παρόντος, δεδομένου ότι σε κάθε χώρα, η καλλιέργεια επηρεάζεται από διαφορετικές κλιματικές, εδαφολογικές και λοιπές τοπικές συνθήκες, καλλιεργητικούς τρόπους, συμβουλές και συνήθειες.

Οδηγίες καλλιέργειας

Λίπανση [1]

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία –10%.Κατά προτίμηση σε χωριστές εφαρμογές, η δεύτερη λίγο μετά την έναρξη κονδυλοποίησης.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία +10%.

Μεταχείριση σπόρου

Το σπάσιμο του κύριου φύτρου και η σωστή προβλάστηση είναι ιδανική μέθοδος.Εάν απαιτηθεί σπάσιμο των φύτρων, δεν πρέπει να γίνει πάνω από μία φορά, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

Αποστάσεις φύτευσης

28/35 mm: 25 cm (53.000 φυτά/10 στρ.)
35/55 mm: 30 cm (44.500 φυτά/10 στρ.)

[1] Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους

Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), δεν προκαλεί πρόβλημα στο φύλλωμα ή μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Αυστηρό προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου είναι απαραίτητο.

Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης - .

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 ºC. Κατάλληλη για άμεση χρήση ή μετά από σύντομο χρόνο αποθήκευσης.



Say potato, say Agrico.

Ανθεκτικότητες

Ίωση – LRV: - / -
Ίωση – Yn: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5
Ίωση – Yntn (κονδύλου): ευαίσθητη / 5
Ίωση- Spraing: πολύ ευαίσθητη / 4
Περονόσπορος φύλλων: πολύ ευαίσθητη / 4
Περονόσπορος κονδύλων: ελάχιστα ευαίσθητη / 6
Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5
Ακτινομύκωση: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Σπογγοσπορίωση: πολύ ευαίσθητη / 2
Εξωτερικά μαύρα στίγματα: πολύ ευαίσθητη / 4,5
Καρκίνωση 1: ελάχιστα ευαίσθητη / 9
Καρκίνωση 6: - / -
Καρκίνωση 18: - / -
Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9
Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -
Νηματώδης Pa2: - / -
Νηματώδης Pa3: - / -

AGRICO
Τεχνοφάρμα Α.Ε. • Προμπονά 24 • Αθήνα 111 43 τηλ: 210 25 16 185
technofa@otenet.gr www.agricopotatoes.gr