

Sevilla.



**Βιολογική
καλλιέργεια**



**Βιομηχανικές
Τσιπς**
Προηγανισμένες/τηγάνι

Image:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: N. Vos

Διασταύρωση: AGRIA x DOB 1997-507-015

Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2048

Σπορόφυτο: VOS 2006-001-001

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: όψιμη / 4,5

Χρώμα φύτρου: - / -

Χρώμα άνθους: μωβ / P

Αριθμός μούρων: - / -

Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7,5

Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: αρκετά καλή / 7,5

Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7,5

Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y

Χρώμα σάρκας: κίτρινο / 7

Εμφάνιση φλοιού: κάτω του μετρίου / 5,5

Σχήμα κονδύλου: οβάλ / O

Ομοιομορφία κονδύλων: αρκετά κανονικό / 6

Κονδυλοποίηση: αρκετά υψηλή / 7

Μέγεθος κονδύλου: αρκετά μεγάλο / 7

Κανονικότητα μεγέθους: αρκετά κανονικό / 6,5

Λήθαργος: μακρύς / 8

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Μηχανικοί χειρισμοί: ευαίσθητη / 5,5

Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Βάρος εντός νερού: 385

Στερεά ουσία: 21%

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): μαλακή / C

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6

Κατανομή στερεάς ουσίας: καλή / 7

Ποιότητα τσιπς: - / -

Οδηγίες καλλιέργειας

Λίπανση ¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία -10%.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία.

Μεταχείριση σπόρου

Συνιστάται σύντομο θερμικό σοκ ή σωστή προβλάστηση. Εάν απαιτηθεί σπάσιμο των φύτρων, δεν πρέπει να γίνει πάνω από μία φορά, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

Αποστάσεις φύτευσης

28/35 mm: 20 cm (67.000 plants/ha)

35/55 mm: 28 cm (48.000 plants/ha)

¹ Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους

Ζιζάνια

Η ενδεχόμενη χρήση του metribuzin (Sencor), δεν προκαλεί πρόβλημα στο φύλλωμα ή μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Παρά την ανθεκτικότητα στον περονόσπορο, χρειάζεται επαγρύπνηση για προσβολές.

Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης - .

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 7 °C. Κατάλληλη για μεγάλο χρόνο αποθήκευσης.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Ανθεκτικότητες

Ίωση - LRV: - / -

Ίωση - Yn: - / -

Ίωση - Yntn (κονδύλου): - / -

Ίωση- Spraing: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Περωνόσπορος φύλλων: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 9

Περωνόσπορος κονδύλων: - / -

Φουζάριο: ευαίσθητη / 5

Ακτινομύκωση: πολύ ευαίσθητη / 4,5

Σπογγοσπορίωση: - / -

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: - / -

Καρκίνωση 1: - / -

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -