


Leonore.



Βιομηχανικές
Προτηγανισμένες/τηγάνι



characteristics

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: Agrico Research B.V.

Διασταύρωση: EXCELLENCY x AR 06-3754

Σπορόφυτο: AR 13-1059

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: πρώιμη / 7,5

Χρώμα φύτρου: - / -

Χρώμα άνθους: λευκό / W

Αριθμός μούρων: μηδενικός / 8

Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: γρήγορη / 8

Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: καλή / 8

Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7

Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y

Χρώμα σάρκας: κίτρινο / 7

Εμφάνιση φλοιού: καλή / 7

Σχήμα κονδύλου: μακρύ οβάλ / LO

Ομοιομορφία κονδύλων: αρκετά κανονικό / 6

Κονδυλοποίηση: κανονική / 6,5

Μέγεθος κονδύλου: αρκετά μεγάλο / 7,5

Κανονικότητα μεγέθους: αρκετά κανονικό / 6,5

Λήθαργος: μέτριος / 6

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Μηχανικοί χειρισμοί: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Βάρος εντός νερού: 397

Στερεά ουσία: 21,5%

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): μαλακή / BC

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: πολύ ευαίσθητη / 4,5

Κατανομή στερεάς ουσίας: καλή / 7,5

Ποιότητα τσιπς: - / -

How to grow

Λίπανση ¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία +10%.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία.

Μεταχείριση σπόρου

Εάν απαιτηθεί σπάσιμο των φύτρων, δεν πρέπει να γίνει πάνω από μία φορά, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

Planting distance

28/35 mm: 24 cm (55.000 plants/ha)

35/55 mm: 31 cm (42.000 plants/ha)

Plant Leonore a bit deeper than other varieties to avoid green tubers.

¹ Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους

Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), μπορεί να επηρεάσει ελαφρώς το φύλλωμα αλλά σπάνια προκαλεί μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Αυστηρό προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου είναι απαραίτητο.

Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης - .

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 7 °C. Κατάλληλη για άμεση χρήση ή μετά από σύντομο χρόνο αποθήκευσης.



Say potato,
say **Agrico.**

Ανθεκτικότητες

Ίωση - LRV: - / -

Ίωση - Yn: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Ίωση - Yntn (κονδύλου): ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ίωση- Spraing: ευαίσθητη / 5,5

Περονόσπορος φύλλων: πολύ ευαίσθητη / 3,5

Περονόσπορος κονδύλων: ευαίσθητη / 5

Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ακτινομύκωση: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Σπογγοσπορίωση: πολύ ευαίσθητη / 3

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ευαίσθητη / 5

Καρκίνωση 1: ανθεκτική / 10

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -