CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Arizona.

Μεσοπρώιμη, υψηλής απόδοσης, ανθεκτική στους ιούς προσαρμόζεται σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες.

Γενικής Χρήσης

Image:

- **Μεγάλοι οβάλ, ομοιόμορφοι κόνδυλοι**
- **Υποκίτρινη, ιδανική για φούρνο**
- **Καλή αντοχή στη ζέστη και στους μηχανικούς χειρισμούς**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: Agrico Research B.V.
Διασταύρωση: UK 150-19D22 x MASCOTTE
Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2040
Σπορόφυτο: AR 98-0313

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοπρώιμη / 7
Χρώμα φύτρου: κόκκινο βιολετί / RV
Χρώμα άνθους: λευκό / W
Αριθμός μούρων: άνω του κανονικού / 5
Φύλλωμα – αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7
Φύλλωμα – τελική ανάπτυξη: καλή / 8
Φύλλωμα – ευρωστία φυτού: κανονική / 6
Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y
Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6
Εμφάνιση φλοιού: άνω του μετρίου / 6,5
Σχήμα κονδύλου: οβάλ / O
Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7,5
Κονδυλοποίηση: κανονική / 6
Μέγεθος κονδύλου: μεγάλο / 8
Κανονικότητα μεγέθους: κανονικό / 7
Λήθαργος: μέτριος / 6

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: ελάχιστα ευαίσθητη / 7
Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα ευαίσθητη / 7
Σκασίματα μεγέθους: ελάχιστα ευαίσθητη / 7
Μηχανικοί χειρισμοί: ελάχιστα ευαίσθητη / 7
Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: ευαίσθητη / 5
Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: αρκετά ευαίσθητη / 6,5
Βάρος εντός νερού: 301
Στερεά ουσία: 17%
Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): ελαφρά σφικτή / AB
Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6,5
Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: - / -
Κατανομή στερεάς ουσίας: - / -
Ποιότητα τσιπς: ακατάλληλη / 4

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

AGRICO

CULTIVATION RECOMMENDATION

Οδηγίες καλλιέργειας

Λίπανση [1]

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία –10%.
Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.
Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία.

Μεταχείριση σπόρου

Εάν απαιτηθεί σπάσιμο των φύτρων, δεν πρέπει να γίνει πάνω από μία φορά, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

Αποστάσεις φύτευσης

28/35 mm: 27 cm (50.000 φυτά/10 στρ.)
35/55 mm: 30 cm (45.000 φυτά/10 στρ.)

Ζιζάνια

Η χρήση του metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά μπορεί να επηρεάσει ελαφρώς το φύλλωμα και να προκαλέσει κάποια μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Αυστηρό προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου είναι απαραίτητο.

Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης - .

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 4 ºC. Κατάλληλη για μέσο χρόνο αποθήκευσης.

Image:

Say potato, say Agrico.

Ανθεκτικότητες

Ίωση – LRV: - / -
Ίωση – Yn: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8
Ίωση – Yntn (κονδύλου): ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8
Ίωση- Spraing: ευαίσθητη / 5
Περονόσπορος φύλλων: πολύ ευαίσθητη / 4
Περονόσπορος κονδύλων: ευαίσθητη / 5
Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 6
Ακτινομύκωση: ευαίσθητη / 5,5
Σπογγοσπορίωση: πολύ ευαίσθητη / 2
Εξωτερικά μαύρα στίγματα: πολύ ευαίσθητη / 4
Καρκίνωση 1: ανθεκτική / 10
Καρκίνωση 6: αρκετά ευαίσθητη / 6
Καρκίνωση 18: - / -
Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9
Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -
Νηματώδης Pa2: - / -
Νηματώδης Pa3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com