

Babylon.

Κιτρινόσαρκη ποικιλία με καλή απόδοση και υψηλή ποιότητα.

- ▶ **Ιδανική για τηγάνι, κρατάει το χρώμα και την υφή**
- ▶ **Ανθεκτική σε ιώσεις**
- ▶ **Πολύ μακρύς χρόνος αποθήκευσης**



Βιομηχανικές
Προτηγανισμένες/τηγάνι
Προψυγμένες



Ειδικής
Χρήσης
Για
τυποποίηση



Γενικής
Χρήσης

Image:

characteristics

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: R.K. Bakker

Διασταύρωση: AGRIA MUTANT

Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2046

Σπορόφυτο: BA 06-0001

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: όψιμη / 5

Χρώμα φύτρου: μπλέ βιολετί / BV

Χρώμα άνθους: λευκό / W

Αριθμός μούρων: μηδενικός / 8

Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7

Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: καλή / 8

Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: συμπαγής / 8

Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y

Χρώμα σάρκας: κίτρινο / 7

Εμφάνιση φλοιού: μέτρια / 6

Σχήμα κονδύλου: οβαλ μακρύ / OL

Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7

Κονδυλοποίηση: κανονική / 6

Μέγεθος κονδύλου: μεγάλο / 8

Κανονικότητα μεγέθους: κανονικό / 7

Λήθαργος: μακρύς / 8

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: αρκετά ευαίσθητη / 6

Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαίσθητη / 6

Μηχανικοί χειρισμοί: ευαίσθητη / 5,5

Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Βάρος εντός νερού: 401

Στερεά ουσία: 21,7%

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): μαλακή / BC

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Κατανομή στερεάς ουσίας: καλή / 7

Ποιότητα τσιπς: καλή / 7



How to grow

Λίπανση ¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία -10%.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία +10%.

Μεταχείριση σπόρου

Το σπάσιμο του κύριου φύτρου και η σωστή προβλάστηση είναι ιδανική μέθοδος.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 φυτά/10 στρ.)

35/55 mm: 30 cm (44.000 φυτά/10 στρ.)

50/55 mm: 38 cm (35.000 φυτά/10 στρ.)

Ζιζάνια

Η χρήση του metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά μπορεί να επηρεάσει ελαφρώς το φύλλωμα και να προκαλέσει κάποια μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Συνιστάται προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου.

Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης - .

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 °C. Για βιομηχανική χρήση, να μην αποθηκεύεται κάτω από τους 7 °C. Κατάλληλη για μεγάλο χρόνο αποθήκευσης.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Ανθεκτικότητες

Ίωση - LRV: - / -

Ίωση - Yn: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Ίωση - Yntn (κονδύλου): ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Ίωση- Spraing: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Περονόσπορος φύλλων: ευαίσθητη / 5,5

Περονόσπορος κονδύλων: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Ακτινομύκωση: ευαίσθητη / 5

Σπογγοσπορίωση: - / -

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: πολύ ευαίσθητη / 4,5

Καρκίνωση 1: ανθεκτική / 10

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 8

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -