

Beyonce.

Μεσοόψιμη, κατάλληλη για τη βιομηχανία, καλή περιεκτικότητα σε στερεά ουσία, κατάλληλη για μέσο χρόνο αποθήκευσης και ανθεκτική στον περονόσπορο φύλλων και κονδύλων.



Image:

- ▶ **Ιδανική για τσιπς**
- ▶ **Μακρύς λήθαργος**
- ▶ **Αρκετά υψηλή κονδυλοποίηση, μεγάλοι κόνδυλοι**

characteristics

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: Agrico Research B.V.
 Διασταύρωση: AR 94-2061 x LADY JO
 Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2049
 Σπορόφυτο: AR 08-3271

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοόψιμη / 6
 Χρώμα φύτρου: μπλέ βιολετί / BV
 Χρώμα άνθους: μωβ / P
 Αριθμός μούρων: πολύ υψηλός / 4
 Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7,5
 Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: καλή / 8
 Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7,5
 Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y
 Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6,5
 Εμφάνιση φλοιού: κάτω του μετρίου / 5,5
 Σχήμα κονδύλου: οβάλ στρογγυλό / OR
 Ομοιομορφία κονδύλων: αρκετά κανονικό / 6,5
 Κονδυλοποίηση: αρκετά υψηλή / 7
 Μέγεθος κονδύλου: αρκετά μεγάλο / 7,5
 Κανονικότητα μεγέθους: κανονικό / 7
 Λήθαργος: αρκετά μακρύς / 7

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6
 Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5
 Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαίσθητη / 6,5
 Μηχανικοί χειρισμοί: αρκετά ευαίσθητη / 6
 Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: αρκετά ευαίσθητη / 6,5
 Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: ελάχιστα ευαίσθητη / 7
 Βάρος εντός νερού: 446
 Στερεά ουσία: 23,9%
 Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): μαλακή / BC
 Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7
 Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8
 Κατανομή στερεάς ουσίας: κανονική / 6,5
 Ποιότητα τσιπς: εξαιρετική / 8

How to grow



Λίπανση ¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία.
Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.
Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία +25%.

Μεταχείριση σπόρου

Μπορεί να φυτευτεί κατ' ευθείαν από την ψύξη, μετά από σύντομο θερμικό σοκ. Να αποφεύγεται σπάσιμο των φύτρων, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

Planting distance

28/35 mm: 23 cm (58.000 φυτά/10 στρ.)
 35/55 mm: 27 cm (50.000 φυτά/10 στρ.)

Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), δεν προκαλεί πρόβλημα στο φύλλωμα ή μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Παρά την ανθεκτικότητα στον περονόσπορο, χρειάζεται επαγρύπνηση για προσβολές.

Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης - .

Για βιομηχανική χρήση, να μην αποθηκεύεται κάτω από τους 9 °C. Κατάλληλη για μέσο χρόνο αποθήκευσης.

Image:

Say potato,
say **Agrico.**

Ανθεκτικότητες

Ίωση - LRV: - / -
 Ίωση - Yn: ευαίσθητη / 5,5
 Ίωση - Yntn (κονδύλου): ευαίσθητη / 5
 Ίωση- Spraing: ελάχιστα ευαίσθητη / 6
 Περονόσπορος φύλλων: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8,5
 Περονόσπορος κονδύλων: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5
 Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5
 Ακτινομύκωση: ευαίσθητη / 5,5

Σπογγοσπορίωση: ελάχιστα ευαίσθητη / 6
 Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5
 Καρκίνωση 1: - / -
 Καρκίνωση 6: - / -
 Καρκίνωση 18: - / -
 Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ευαίσθητη / 4
 Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -
 Νηματώδης Pa2: - / -
 Νηματώδης Pa3: - / -