CULTIVATION **RECOMMENDATION**

# Jacky.

Μεσοπρώιμη, με πολύ καλή απόδοση και αντοχή στον περονόσπορο.

- **Μικροί κόνδυλοι, ιδανική για παραγωγή baby**
- **Υψηλή κονδυλοποίηση**
- **Καλή αντοχή στους μηχανικούς χειρισμούς**

**Βιολογική καλλιέργεια** | **Βιομηχανικές** Προψυγμένες | **Ειδικής Χρήσης** Baby

Image:

# ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

## Γενικά Χαρακτηριστικά

**Δημιουργός:** Lantmännen Seed B.V.
**Διασταύρωση:** ANOUK x ATHLETE
**Δικαιώματα δημιουργού:** 31-12-2049
**Σπορόφυτο:** SW 09-0557

## Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

**Πρωιμότητα:** μεσοπρώιμη / 6,5
**Χρώμα φύτρου:** πρασινοκόκκινο / GR
**Χρώμα άνθους:** ανοικτό μωβ / LP
**Αριθμός μούρων:** κάτω του κανονικού / 6,5
**Φύλλωμα – αρχική ανάπτυξη:** αρκετά γρήγορη / 7,5
**Φύλλωμα – τελική ανάπτυξη:** αρκετά καλή / 7,5
**Φύλλωμα – ευρωστία φυτού:** αρκετά συμπαγής / 7
**Χρώμα φλοιού:** κίτρινο / Y
**Χρώμα σάρκας:** υποκίτρινο / 6,5
**Εμφάνιση φλοιού:** άνω του μετρίου / 6,5
**Σχήμα κονδύλου:** στρογγυλό οβάλ / RO
**Ομοιομορφία κονδύλων:** αρκετά κανονικό / 6,5
**Κονδυλοποίηση:** υψηλή / 9
**Μέγεθος κονδύλου:** κανονικό / 6,5
**Κανονικότητα μεγέθους:** αρκετά κανονικό / 6
**Λήθαργος:** αρκετά σύντομος / 5,5

## Ανθεκτικότητες και ποιότητα

**Δευτερογενής ανάπτυξη:** αρκετά ευαίσθητη / 6
**Εσωτερικές μαύρες κηλίδες:** ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8
**Σκασίματα μεγέθους:** αρκετά ευαίσθητη / 6,5
**Μηχανικοί χειρισμοί:** ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8
**Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά:** ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5
**Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά:** ελάχιστα ευαίσθητη / 7
**Βάρος εντός νερού:** 368
**Στερεά ουσία:** 20,1%
**Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο):** ελαφρά μαλακή / B
**Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα:** αρκετά ευαίσθητη / 6,5
**Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα:** αρκετά ευαίσθητη / 6
**Κατανομή στερεάς ουσίας:** καλή / 7
**Ποιότητα τσιπς:** ακατάλληλη / 5

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

CULTIVATION RECOMMENDATION

# Οδηγίες καλλιέργειας

## Λίπανση [1]

**Άζωτο:** συνηθισμένη δοσολογία.

**Φώσφορος:** συνηθισμένη δοσολογία.

**Κάλιο:** συνηθισμένη δοσολογία.

## Μεταχείριση σπόρου

Μπορεί να φυτευτεί κατ□ ευθείαν από την ψύξη, μετά από σύντομο θερμικό σοκ.Να αποφεύγεται σπάσιμο των φύτρων, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

## Αποστάσεις φύτευσης

28/35 mm: 20 cm (67.000 φυτά/10 στρ.)

35/55 mm: 25 cm (54.000 φυτά/10 στρ.)

## Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), δεν προκαλεί πρόβλημα στο φύλλωμα ή μείωση της παραγωγής.

## Μυκητοκτόνα

Παρά την ανθεκτικότητα στον περονόσπορο, χρειάζεται επαγρύπνηση για προσβολές.

## Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

## Θερμοκρασία αποθήκευσης - .

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 ºC. Κατάλληλη για μέσο χρόνο αποθήκευσης.

Image:

Say potato, say Agrico.

## Ανθεκτικότητες

**Ίωση – LRV:** - / -

**Ίωση – Yn:** πολύ ευαίσθητη / 4,5

**Ίωση – Yntn (κονδύλου):** ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

**Ίωση- Spraing:** ελάχιστα ευαίσθητη / 6

**Περονόσπορος φύλλων:** ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 9

**Περονόσπορος κονδύλων:** ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 9

**Φουζάριο:** ευαίσθητη / 5,5

**Ακτινομύκωση:** ευαίσθητη / 5,5

**Σπογγοσπορίωση:** πολύ ευαίσθητη / 2

**Εξωτερικά μαύρα στίγματα:** ελάχιστα ευαίσθητη / 6

**Καρκίνωση 1:** - / -

**Καρκίνωση 6:** - / -

**Καρκίνωση 18:** - / -

**Χρυσονηματώδεις Ro 1/4:** ανθεκτική / 9

**Χρυσονηματώδεις Ro 2/3:** - / -

**Νηματώδης Pa2:** - / -

**Νηματώδης Pa3:** - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com