

# Levante.

Γενικής χρήσης, υψηλής απόδοσης, κατάλληλη και για βιολογική καλλιέργεια.



Βιολογική  
καλλιέργεια



Ειδικής  
Χρήσης  
Για  
τυποποίηση



Γενικής  
Χρήσης

- ▶ **Υψηλή κονδυλοποίηση και απόδοση, ιδανική για τηγάνι**
- ▶ **Υποκίτρινη, ανθεκτική στον περονόσπορο**
- ▶ **Πολύ καλή αποθήκευση**

Image:

## characteristics

### Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: Agrico Research B.V.  
Διασταύρωση: AR 01-3218 x ALMERA  
Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2048  
Σπορόφυτο: AR 07-3009

### Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοόψιμη / 5,5  
Χρώμα φύτρου: πρασινοκόκκινο / GR  
Χρώμα άνθους: λευκό / W  
Αριθμός μούρων: άνω του κανονικού / 5,5  
Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7  
Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: καλή / 8  
Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7  
Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y  
Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6  
Εμφάνιση φλοιού: καλή / 7  
Σχήμα κονδύλου: μακρύ οβάλ / LO  
Ομοιομορφία κονδύλων: αρκετά κανονικό / 6,5  
Κονδυλοποίηση: υψηλή / 8  
Μέγεθος κονδύλου: αρκετά μεγάλο / 7  
Κανονικότητα μεγέθους: κανονικό / 7  
Λήθαργος: μέτριος / 6,5

### Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: ελάχιστα ευαίσθητη / 7  
Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: αρκετά ευαίσθητη / 6,5  
Σκασίματα μεγέθους: ελάχιστα ευαίσθητη / 7  
Μηχανικοί χειρισμοί: αρκετά ευαίσθητη / 6  
Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: αρκετά ευαίσθητη / 6,5  
Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: ευαίσθητη / 5,5  
Βάρος εντός νερού: 365  
Στερεά ουσία: 19,9%  
Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): ελαφρά μαλακή / B  
Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7  
Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: ευαίσθητη / 5,5  
Κατανομή στερεάς ουσίας: - / -  
Ποιότητα τσιπς: ακατάλληλη / 4,5

# How to grow



## Λίπανση <sup>1</sup>

**Άζωτο:** συνηθισμένη δοσολογία. Κατά προτίμηση σε χωριστές εφαρμογές, η δεύτερη λίγο μετά την έναρξη κονδυλοποίησης.

**Φώσφορος:** συνηθισμένη δοσολογία.

**Κάλιο:** συνηθισμένη δοσολογία.

## Μεταχείριση σπόρου

Συνιστάται φύτευση σε ζεστό έδαφος, καθώς η αρχική ανάπτυξη είναι αργή. Να αποφεύγεται σπάσιμο των φύτρων, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους. Συνιστάται σύντομο θερμικό σοκ ή σωστή προβλάστηση.

## Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 φυτά/10 στρ.)

35/55 mm: 27 cm (49.500 φυτά/10 στρ.)

## Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), δεν προκαλεί πρόβλημα στο φύλλωμα ή μείωση της παραγωγής.

## Μυκητοκτόνα

Παρά την ανθεκτικότητα στον περονόσπορο, χρειάζεται επαγρύπνηση για προσβολές.

## Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

## Θερμοκρασία αποθήκευσης - .

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 4 °C. Κατάλληλη για μέσο ή μεγάλο χρόνο αποθήκευσης.

Image:

Say potato,  
say Agrico.

## Ανθεκτικότητες

Ίωση - LRV: - / -

Ίωση - Yn: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ίωση - Yntn (κονδύλου): ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8,5

Ίωση- Spraing: πολύ ευαίσθητη / 4,5

Περονόσπορος φύλλων: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8,5

Περονόσπορος κονδύλων: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ακτινομύκωση: ευαίσθητη / 5

Σπογγοσπορίωση: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Καρκίνωση 1: - / -

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -