

Lugano.

Κατάλληλη και για τη βιομηχανία, υψηλή στερεά ουσία.



Βιομηχανικές
Προτηγανισμένες/τηγάνι



Γενικής
Χρήσης

Image:

- ▶ **Κιτρινόσαρκη, ιδανική για τηγάνι**
- ▶ **Μεγάλοι κόνδυλοι, ανθεκτική στους νηματώδεις**
- ▶ **Πολύ μακρύς χρόνος αποθήκευσης, καλές αποδόσεις**

characteristics

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: F.J. Vos

Διασταύρωση: AR 00-2211 x AR 99-0669

Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2048

Σπορόφυτο: VO 07-0289

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοόψιμη / 5,5

Χρώμα φύτρου: κόκκινο / R

Χρώμα άνθους: λευκό / W

Αριθμός μούρων: κάτω του κανονικού / 7

Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7

Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: καλή / 8

Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7,5

Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y

Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6,5

Εμφάνιση φλοιού: μέτρια / 6

Σχήμα κονδύλου: οβαλ μακρύ / OL

Ομοιομορφία κονδύλων: αρκετά κανονικό / 6

Κονδυλοποίηση: αρκετά χαμηλή / 5

Μέγεθος κονδύλου: μεγάλο / 8

Κανονικότητα μεγέθους: κανονικό / 7

Λήθαργος: μακρύς / 8

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: αρκετά ευαίσθητη / 6

Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Μηχανικοί χειρισμοί: πολύ ευαίσθητη / 4,5

Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Βάρος εντός νερού: 394

Στερεά ουσία: 21,4%

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): ελαφρά μαλακή / B

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6

Κατανομή στερεάς ουσίας: καλή / 7,5

Ποιότητα τσιπς: κάτω του κανονικού / 5,5

How to grow



Λίπανση ¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία.
Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.
Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία +20%.

Μεταχείριση σπόρου

Μπορεί να φυτευτεί κατ' ευθείαν από την ψύξη, μετά από σύντομο θερμικό σοκ. Εάν απαιτηθεί σπάσιμο των φύτρων, δεν πρέπει να γίνει πάνω από δύο φορές, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.000 φυτά/10 στρ.)
 35/55 mm: 30 cm (45.000 φυτά/10 στρ.)
 50/55 mm: 36 cm (37.000 φυτά/10 στρ.)

Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), δεν προκαλεί πρόβλημα στο φύλλωμα ή μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Συνιστάται προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου.

Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης - .

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 °C. Για βιομηχανική χρήση, να μην αποθηκεύεται κάτω από τους 7 °C. Κατάλληλη για μεγάλο χρόνο αποθήκευσης.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Ανθεκτικότητες

Ίωση - LRV: - / -
 Ίωση - Yn: ευαίσθητη / 5,5
 Ίωση - Yntn (κονδύλου): ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5
 Ίωση- Spraing: ευαίσθητη / 5,5
 Περονόσπορος φύλλων: ευαίσθητη / 5
 Περονόσπορος κονδύλων: ευαίσθητη / 5,5
 Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5
 Ακτινομύκωση: ευαίσθητη / 5,5

Σπογγοσπορίωση: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5
 Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ελάχιστα ευαίσθητη / 6
 Καρκίνωση 1: ανθεκτική / 10
 Καρκίνωση 6: ελάχιστα ευαίσθητη / 9
 Καρκίνωση 18: - / -
 Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9
 Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: ανθεκτική / 9
 Νηματώδης Pa2: ανθεκτική / 9
 Νηματώδης Pa3: ανθεκτική / 9