

Markies.

Όψιμη, υψηλές αποδόσεις, ιδανική για τηγάνι και βιομηχανική επεξεργασία (προτηγανισμένες, κοπτήρια), μεγάλος χρόνος αποθήκευσης.



Βιομηχανικές
Προτηγανισμένες/τηγάνι
Τσιπς



Γενικής
Χρήσης

Image:

- ▶ **Μεγάλοι ομοιόμορφοι οβάλ-μακρείς κόνδυλοι**
- ▶ **Ανθεκτική στις ιώσεις και στους νηματώδεις Ro 1/4.**
- ▶ **Υψηλή στερεά ουσία, καλή αντοχή στον περονόσπορο**

characteristics

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.

Διασταύρωση: FIANNA x AGRIA

Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2029

Σπορόφυτο: MA 85-0698

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: όψιμη / 4

Χρώμα φύτρου: μπλέ βιολετί / BV

Χρώμα άνθους: λευκό / W

Αριθμός μούρων: κάτω του κανονικού / 6,5

Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7

Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: καλή / 8

Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: συμπαγής / 8

Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y

Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6,5

Εμφάνιση φλοιού: καλή / 7

Σχήμα κονδύλου: οβαλ μακρύ / OL

Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7

Κονδυλοποίηση: κανονική / 6

Μέγεθος κονδύλου: αρκετά μεγάλο / 7,5

Κανονικότητα μεγέθους: κανονικό / 7

Λήθαργος: μέτριος / 6,5

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Σκασίματα μεγέθους: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Μηχανικοί χειρισμοί: ευαίσθητη / 5

Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Βάρος εντός νερού: 427

Στερεά ουσία: 22,8%

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): μαλακή / BC

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Κατανομή στερεάς ουσίας: καλή / 7,5

Ποιότητα τσιπς: καλή / 7

How to grow



Λίπανση ¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία -10%. Κατά προτίμηση σε τρεις εφαρμογές, η δεύτερη λίγο μετά την έναρξη κονδυλοποίησης.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία +10%.

Μεταχείριση σπόρου

Το σπάσιμο του κύριου φύτερου και η σωστή προβλάστηση είναι ιδανική μέθοδος. Προαιρετικό σπάσιμο των φύτερων μια φορά.

Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 φυτά/10 στρ.)

35/55 mm: 33 cm (40.000 φυτά/10 στρ.)

50/55 mm: 40 cm (33.000 φυτά/10 στρ.)

Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), μπορεί να επηρεάσει ελαφρώς το φύλλωμα αλλά σπάνια προκαλεί μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Συνιστάται προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου.

Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης - .

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 °C. Για βιομηχανική χρήση, να μην αποθηκεύεται κάτω από τους 7 °C. Κατάλληλη για μέσο χρόνο αποθήκευσης.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Ανθεκτικότητες

Ίωση - LRV: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Ίωση - Yn: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Ίωση - Yntn (κονδύλου): ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Ίωση- Spraing: πολύ ευαίσθητη / 4

Περονόσπορος φύλλων: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Περονόσπορος κονδύλων: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Φουζάριο: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Ακτινομύκωση: ευαίσθητη / 5

Σπογγοσπορίωση: πολύ ευαίσθητη / 3,5

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: - / -

Καρκίνωση 1: - / -

Καρκίνωση 6: αρκετά ευαίσθητη / 5

Καρκίνωση 18: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -