

# Napoleon.



Βιομηχανικές  
Τσιπς

Όψιμη, με καλή ομοιομορφία μεγέθους κονδύλων και υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά ουσία.

Image:

- ▶ **Ιδανική για τσιπς, εξαιρετική ποιότητα**
- ▶ **Καλή αντοχή στον περονόσπορο και την ακτινομύκωση**
- ▶ **Καλή αντοχή σε ιώσεις**

## characteristics

### Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: Agrico Research B.V.

Διασταύρωση: ANTINA x ALICANTE

Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2051

Σπορόφυτο: AR 10-4637

### Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: όψιμη / 5

Χρώμα φύτρου: κόκκινο βιολετί / RV

Χρώμα άνθους: λευκό / W

Αριθμός μούρων: πολύ υψηλός / 4

Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7

Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: καλή / 8

Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7,5

Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y

Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6,5

Εμφάνιση φλοιού: αρκετά πτωχή / 5

Σχήμα κονδύλου: στρογγυλό οβάλ / RO

Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7

Κονδυλοποίηση: κανονική / 6

Μέγεθος κονδύλου: αρκετά μεγάλο / 7,5

Κανονικότητα μεγέθους: κανονικό / 7

Λήθαργος: μέτριος / 6

### Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ευαίσθητη / 5,5

Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαίσθητη / 6

Μηχανικοί χειρισμοί: πολύ ευαίσθητη / 4,5

Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Βάρος εντός νερού: 450

Στερεά ουσία: 24,1%

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): μαλακή / BC

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6

Κατανομή στερεάς ουσίας: καλή / 7

Ποιότητα τσιπς: εξαιρετική / 8

# How to grow



## Λιπανση <sup>1</sup>

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία -10%.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία +20%.

## Μεταχείριση σπόρου

Το σπάσιμο του κύριου φύτρου και η σωστή προβλάστηση είναι ιδανική μέθοδος. Να αποφεύγεται σπάσιμο των φύτρων, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

## Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 φυτά/10 στρ.)

35/55 mm: 30 cm (45.000 φυτά/10 στρ.)

50/55 mm: 40 cm (33.000 φυτά/10 στρ.)

## Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), δεν προκαλεί πρόβλημα στο φύλλωμα ή μείωση της παραγωγής.

## Μυκητοκτόνα

Συνιστάται προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου.

## Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

## Θερμοκρασία αποθήκευσης - .

Για βιομηχανική χρήση, να μην αποθηκεύεται κάτω από τους 9 °C. Κατάλληλη για μέσο ή μεγάλο χρόνο αποθήκευσης.

Image:

Say potato,  
say Agrico.

## Ανθεκτικότητες

Ίωση - LRV: - / -

Ίωση - Υη: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Ίωση - Υηηη (κονδύλου): ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Ίωση- Spraing: ευαίσθητη / 5

Περονόσπορος φύλλων: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Περονόσπορος κονδύλων: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Ακτινομύκωση: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Σπογγοσπορίωση: - / -

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Καρκίνωση 1: ανθεκτική / 10

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: ευαίσθητη / 4

Νηματώδης Pa3: ευαίσθητη / 2