

Agria.

Κιτρινόσαρκτη, κατάλληλη και για βιομηχανική.



**Βιολογική
καλλιέργεια**



**Βιομηχανικές
Προτηγανισμένες/τηγάνι
Τσιπς
Προφυγμένες**



**Ειδικής
Χρήσης
Για
τυποποίηση**



**Γενικής
Χρήσης**

- ▶ **Ιδανική για τηγάνι, δε μαλακώνει, δε μεταχρωματίζεται**
- ▶ **Ανθεκτική σε ιώσεις και νηματώδεις Ro 1/4**
- ▶ **Υψηλή στερεά ουσία, μακρύς χρόνος αποθήκευσης**



characteristics

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: Böhm

Διασταύρωση: QUARTA x SEMLO

Δικαιώματα δημιουργού: Έληξαν

Σπορόφυτο: BM 77-0945

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: όψιμη / 5

Χρώμα φύτρου: μπλέ βιολετί / BV

Χρώμα άνθους: λευκό / W

Αριθμός μούρων: μηδενικός / 8

Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7

Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: καλή / 8

Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7

Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y

Χρώμα σάρκας: κίτρινο / 7

Εμφάνιση φλοιού: μέτρια / 6

Σχήμα κονδύλου: οβαλ μακρύ / OL

Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7

Κονδυλοποίηση: αρκετά χαμηλή / 5

Μέγεθος κονδύλου: μεγάλο / 8

Κανονικότητα μεγέθους: κανονικό / 7

Λήθαργος: μακρύς / 8

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: αρκετά ευαίσθητη / 6

Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Μηχανικοί χειρισμοί: ευαίσθητη / 5

Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Βάρος εντός νερού: 402

Στερεά ουσία: 21,8%

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): μαλακή / BC

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Κατανομή στερεάς ουσίας: κανονική / 6,5

Ποιότητα τσιπς: καλή / 7

How to grow

Λίπανση ¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία -10%.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία +10%.

Μεταχείριση σπόρου

Συνιστάται σύντομο θερμικό σοκ ή σωστή προβλάστηση. Το σπάσιμο του κύριου φύτρου και η σωστή προβλάστηση είναι ιδανική μέθοδος.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 φυτά/10 στρ.)

35/55 mm: 30 cm (45.000 φυτά/10 στρ.)

50/55 mm: 40 cm (33.000 φυτά/10 στρ.)

¹ Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους

Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), μπορεί να επηρεάσει ελαφρώς το φύλλωμα αλλά σπάνια προκαλεί μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Συνιστάται προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου.

Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης - .

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 °C. Για βιομηχανική χρήση, να μην αποθηκεύεται κάτω από τους 7 °C. Κατάλληλη για μεγάλο χρόνο αποθήκευσης.



Ανθεκτικότητες

Ίωση - LRV: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ίωση - Υn: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Ίωση - Υntn (κονδύλου): ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Ίωση- Spreaing: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Περονόσπορος φύλλων: ευαίσθητη / 5,5

Περονόσπορος κονδύλων: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Ακτινομύκωση: πολύ ευαίσθητη / 4,5

Say potato,
say **Agrico.**

Σπογγοσπορίωση: πολύ ευαίσθητη / 3

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: - / -

Καρκίνωση 1: ελάχιστα ευαίσθητη / 9

Καρκίνωση 6: αρκετά ευαίσθητη / 6

Καρκίνωση 18: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: ευαίσθητη / 2

Νηματώδης Pa3: ευαίσθητη / 2