

Levante.

Γενικής χρήσης, υψηλής απόδοσης,
κατάλληλη και για βιολογική καλλιέργεια.



**Βιολογική
καλλιέργεια**



**Ειδικής
Χρήσης
Για
τυποποίηση**



**Γενικής
Χρήσης**

- ▶ **Υψηλή κονδυλοποίηση και απόδοση,
ιδανική για τηγάνι**
- ▶ **Υποκίτρινη, ανθεκτική στον
περονόσπορο**
- ▶ **Πολύ καλή αποθήκευση**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: Agrico Research B.V.
Διασταύρωση: AR 01-3218 x ALMERA
Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2048
Σπορόφυτο: AR 07-3009

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοόψιμη / 5,5
Χρώμα φύτρου: πρασινοκόκκινο / GR
Χρώμα άνθους: λευκό / W
Αριθμός μούρων: άνω του κανονικού / 5,5
Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7
Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: καλή / 8
Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7
Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y
Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6
Εμφάνιση φλοιού: καλή / 7
Σχήμα κονδύλου: μακρύ οβάλ / LO
Ομοιομορφία κονδύλων: αρκετά κανονικό / 6,5
Κονδυλοποίηση: υψηλή / 8
Μέγεθος κονδύλου: αρκετά μεγάλο / 7
Κανονικότητα μεγέθους: κανονικό / 7
Λήθαργος: μέτριος / 6,5

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: ελάχιστα ευαίσθητη / 7
Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: αρκετά ευαίσθητη / 6,5
Σκασίματα μεγέθους: ελάχιστα ευαίσθητη / 7
Μηχανικοί χειρισμοί: αρκετά ευαίσθητη / 6
Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: αρκετά ευαίσθητη / 6,5
Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: ευαίσθητη / 5,5
Βάρος εντός νερού: 365
Στερεά ουσία: 19,9%
Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): ελαφρά μαλακή / B
Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7
Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: ευαίσθητη / 5,5
Κατανομή στερεάς ουσίας: - / -
Ποιότητα τσιπς: ακατάλληλη / 4,5

Οδηγίες καλλιέργειας

Λίπανση ¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία. Κατά προτίμηση σε χωριστές εφαρμογές, η δεύτερη λίγο μετά την έναρξη κονδυλοποίησης.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία.

Μεταχείριση σπόρου

Συνιστάται φύτευση σε ζεστό έδαφος, καθώς η αρχική ανάπτυξη είναι αργή. Να αποφεύγεται σπάσιμο των φύτεων, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους. Συνιστάται σύντομο θερμικό σοκ ή σωστή προβλάστηση.

Αποστάσεις φύτευσης

28/35 mm: 22 cm (60.500 φυτά/10 στρ.)

35/55 mm: 27 cm (49.500 φυτά/10 στρ.)

¹ Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους

Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), δεν προκαλεί πρόβλημα στο φύλλωμα ή μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Παρά την ανθεκτικότητα στον περονόσπορο, χρειάζεται επαγρύπνηση για προσβολές.

Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης -

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 4 °C. Κατάλληλη για μέσο ή μεγάλο χρόνο αποθήκευσης.



Say potato,
say **Agrico.**

Ανθεκτικότητες

Ίωση - LRV: - / -

Ίωση - Υn: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ίωση - Υntn (κονδύλου): ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8,5

Ίωση- Spraing: πολύ ευαίσθητη / 4,5

Περονόσπορος φύλλων: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8,5

Περονόσπορος κονδύλων: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ακτινομύκωση: ευαίσθητη / 5

Σπογγοσπορίωση: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Καρκίνωση 1: - / -

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -