

Lugano.

Κατάλληλη και για τη βιομηχανία, υψηλή στερεά ουσία.



Βιομηχανικές
Προηγασμένες/τηγάνι



Γενικής
Χρήσης

- ▶ **Κιτρινόσαρκη, ιδανική για τηγάνι**
- ▶ **Μεγάλοι κόνδυλοι, ανθεκτική στους νηματώδεις**
- ▶ **Πολύ μακρύς χρόνος αποθήκευσης, καλές αποδόσεις**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: F.J. Vos

Διασταύρωση: AR 00-2211 x AR 99-0669

Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2048

Σπορόφυτο: VO 07-0289

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοόψιμη / 5,5

Χρώμα φύτρου: κόκκινο / R

Χρώμα άνθους: λευκό / W

Αριθμός μούρων: κάτω του κανονικού / 7

Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7

Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: καλή / 8

Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7,5

Χρώμα φλοιού: κιτρινο / Y

Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6,5

Εμφάνιση φλοιού: μέτρια / 6

Σχήμα κονδύλου: οβαλ μακρύ / OL

Ομοιομορφία κονδύλων: αρκετά κανονικό / 6

Κονδυλοποίηση: αρκετά χαμηλή / 5

Μέγεθος κονδύλου: μεγάλο / 8

Κανονικότητα μεγέθους: κανονικό / 7

Λήθαργος: μακρύς / 8

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: αρκετά ευαίσθητη / 6

Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Μηχανικοί χειρισμοί: πολύ ευαίσθητη / 4,5

Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Βάρος εντός νερού: 394

Στερεά ουσία: 21,4%

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): ελαφρά μαλακή / B

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6

Κατανομή στερεάς ουσίας: καλή / 7,5

Ποιότητα τσιπς: κάτω του κανονικού / 5,5

Οδηγίες καλλιέργειας

Λίπανση ¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία.
Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.
Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία +20%.

Μεταχείριση σπόρου

Μπορεί να φυτευτεί κατ' ευθείαν από την ψύξη, μετά από σύντομο θερμικό σοκ. Εάν απαιτηθεί σπάσιμο των φύτρων, δεν πρέπει να γίνει πάνω από δύο φορές, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

Αποστάσεις φύτευσης

28/35 mm: 22 cm (60.000 φυτά/10 στρ.)
35/55 mm: 30 cm (45.000 φυτά/10 στρ.)
50/55 mm: 36 cm (37.000 φυτά/10 στρ.)

¹ Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους

Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), δεν προκαλεί πρόβλημα στο φύλλωμα ή μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Συνιστάται προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου.

Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης -

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 °C. Για βιομηχανική χρήση, να μην αποθηκεύεται κάτω από τους 7 °C. Κατάλληλη για μεγάλο χρόνο αποθήκευσης.



Say potato,
say **Agrico.**

Ανθεκτικότητες

Ίωση - LRV: - / -
Ίωση - Yn: ευαίσθητη / 5,5
Ίωση - Yntn (κονδύλου): ελάχιστη ευαίσθητη / 7,5
Ίωση- Spraing: ευαίσθητη / 5,5
Περονόσπορος φύλλων: ευαίσθητη / 5
Περονόσπορος κονδύλων: ευαίσθητη / 5,5
Φουζάριο: ελάχιστη ευαίσθητη / 6,5
Ακτινομύκωση: ευαίσθητη / 5,5

Σπογγοσπορίωση: ελάχιστη ευαίσθητη / 7,5
Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ελάχιστη ευαίσθητη / 6
Καρκίνωση 1: ανθεκτική / 10
Καρκίνωση 6: ελάχιστη ευαίσθητη / 9
Καρκίνωση 18: - / -
Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9
Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: ανθεκτική / 9
Νηματώδης Pa2: ανθεκτική / 9
Νηματώδης Pa3: ανθεκτική / 9