

Twister.

Μεσοπρώιμη, γενικής χρήσης, καλή απόδοση και ανθεκτική στον περονόσπορο. Κατάλληλη και για βιολογική καλλιέργεια.

- Όμορφη εμφάνιση
- Καλή αποθήκευση
- Εξαιρετικό τηγάνι



**Βιολογική
καλλιέργεια**



**Ειδικής
Χρήσης
Για
τυποποίηση**



**Γενικής
Χρήσης**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: G.W. te Winkel

Διασταύρωση: ARG 96-0739 x AR 02-9113

Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2048

Σπορόφυτο: TW 08-1507

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοπρώιμη / 7

Χρώμα φύτρου: κόκκινο βιολετί / RV

Χρώμα άνθους: ανοικτό μωβ / LP

Αριθμός μούρων: άνω του κανονικού / 5,5

Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7

Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: αρκετά καλή / 7,5

Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7

Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y

Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6,5

Εμφάνιση φλοιού: καλή / 7

Σχήμα κονδύλου: στρογγυλό οβάλ / RO

Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7

Κονδυλοποίηση: κανονική / 6,5

Μέγεθος κονδύλου: αρκετά μεγάλο / 7

Κανονικότητα μεγέθους: αρκετά κανονικό / 6,5

Λήθαργος: αρκετά μακρύς / 7

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Μηχανικοί χειρισμοί: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: πολύ ευαίσθητη / 3

Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: πολύ ευαίσθητη / 3

Βάρος εντός νερού: 345

Στερεά ουσία: 19%

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): ελαφρά σφικτή / AB

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6

Κατανομή στερεάς ουσίας: - / -

Ποιότητα τσιπς: ακατάλληλη / 4

Οδηγίες καλλιέργειας

Λίπανση ¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία +20%.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία.

Μεταχείριση σπόρου

Μπορεί να φυτευτεί κατ' ευθείαν από την ψύξη, μετά από σύντομο θερμικό σοκ. Προαιρετικό σπάσιμο των φύτρων μια φορά.

Αποστάσεις φύτευσης

28/35 mm: 22 cm (60.500 φυτά/10 στρ.)

35/50 mm: 25 cm (54.000 φυτά/10 στρ.)

¹ Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους

Ζιζάνια

Να μη χρησιμοποιείται metribuzin (Sencor) μεταφύτρωτικά, καθώς επηρεάζει σημαντικά το φύλλωμα και προκαλεί σημαντική μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Παρά την ανθεκτικότητα στον περονόσπορο, χρειάζεται επαγρύπνηση για προσβολές.

Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης -

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 6 °C. Κατάλληλη για μέσο ή μεγάλο χρόνο αποθήκευσης.



Say potato,
say **Agrico.**

Ανθεκτικότητες

Ίωση - LRV: - / -

Ίωση - Υn: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Ίωση - Υntn (κονδύλου): ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Ίωση- Spraing: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Περονόσπορος φύλλων: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 9

Περονόσπορος κονδύλων: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 9

Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ακτινομύκωση: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Σπογγοσπορίωση: ευαίσθητη / 5

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Καρκίνωση 1: μέτρια ευαίσθητη / 8

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -