
Jolene.

Μεσοόψιμη, με καλή αντοχή στη ζέστη και υψηλή απόδοση.

- **Ανοικτό κίτρινο χρώμα σάρκας**
- **Γενικής χρήσης, πολύ καλή για τηγάνι**
- **Καλή περιεκτικότητα σε στερεά ουσία**

Ειδικής Χρήσης Για τυποποίηση

Γενικής Χρήσης



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: Agrico Research B.V.
Διασταύρωση: SAGITTA x AR 03-1491
Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2050
Σπορόφυτο: AR 09-2556

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοόψιμη / 6
Χρώμα φύτρου: κόκκινο / R
Χρώμα άνθους: λευκό / W
Αριθμός μούρων: κάτω του κανονικού / 7
Φύλλωμα – αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7,5
Φύλλωμα – τελική ανάπτυξη: καλή / 8
Φύλλωμα – ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7,5
Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y
Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6
Εμφάνιση φλοιού: καλή / 7
Σχήμα κονδύλου: οβαλ μακρύ / OL
Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7
Κονδυλοποίηση: αρκετά υψηλή / 7
Μέγεθος κονδύλου: αρκετά μεγάλο / 7,5
Κανονικότητα μεγέθους: κανονικό / 7
Λήθαργος: μέτριος / 6

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: ελάχιστα ευαίσθητη / 7
Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα ευαίσθητη / 7
Σκασίματα μεγέθους: ελάχιστα ευαίσθητη / 7
Μηχανικοί χειρισμοί: αρκετά ευαίσθητη / 6
Q_Discolouration after frying: αρκετά ευαίσθητη / 6,5
Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: αρκετά ευαίσθητη / 6,5
Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8
Βάρος εντός νερού: 389
Στερεά ουσία: 21,1%
Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): ελαφρά μαλακή / B
Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6,5
Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7
Κατανομή στερεάς ουσίας: - / -
Ποιότητα τσιπς: ακατάλληλη / 5

Η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ, δεν είναι υπεύθυνοι για ζημιές σχετιζόμενες με τη χρήση των πληροφοριών του παρόντος, δεδομένου ότι σε κάθε χώρα, η καλλιέργεια επηρεάζεται από διαφορετικές κλιματικές, εδαφολογικές και λοιπές τοπικές συνθήκες, καλλιεργητικούς τρόπους, συμβουλές και συνήθειες.

Οδηγίες καλλιέργειας

Λίπανση [1]

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία +10%.

Μεταχείριση σπόρου

Μπορεί να φυτευτεί κατ□ ευθείαν από την ψύξη, μετά από σύντομο θερμικό σοκ.Εάν απαιτηθεί σπάσιμο των φύτρων, δεν πρέπει να γίνει πάνω από μία φορά, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

Αποστάσεις φύτευσης

28/35 mm: 22 cm (60.500 φυτά/10 στρ.)
35/55 mm: 25 cm (54.000 φυτά/10 στρ.)

[1] Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους

Ζιζάνια

Η χρήση του metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά μπορεί να επηρεάσει ελαφρώς το φύλλωμα και να προκαλέσει κάποια μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Αυστηρό προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου είναι απαραίτητο.

Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης - .

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 ºC. Κατάλληλη για μέσο χρόνο αποθήκευσης.



Say potato, say Agrico.

Ανθεκτικότητες

Ίωση – LRV: - / -

Ίωση – Yn: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Ίωση – Yntn (κονδύλου): ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Ίωση- Spraing: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Περονόσπορος φύλλων: πολύ ευαίσθητη / 4

Περονόσπορος κονδύλων: ευαίσθητη / 5

Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ακτινομύκωση: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Σπογγοσπορίωση: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Καρκίνωση 1: - / -

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -

AGRICO

Τεχνοφάρμα Α.Ε. • Προμπονά 24 • Αθήνα 111 43 τηλ: 210 25 16 185
technofa@otenet.gr www.agricopotatoes.gr