ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Napoleon.

Βιομηχανικές
Τσιπς

Όψιμη, με καλή ομοιομορφία μεγέθους κονδύλων και υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά ουσία.

- **Ιδανική για τσιπς, εξαιρετική ποιότητα**
- **Καλή αντοχή στον περονόσπορο και την ακτινομύκωση**
- **Καλή αντοχή σε ιώσεις**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: Agrico Research B.V.
Διασταύρωση: ANTINA x ALICANTE
Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2051
Σπορόφυτο: AR 10-4637

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: όψιμη / 5
Χρώμα φύτρου: κόκκινο βιολετί / RV
Χρώμα άνθους: λευκό / W
Αριθμός μούρων: πολύ υψηλός / 4
Φύλλωμα – αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7
Φύλλωμα – τελική ανάπτυξη: καλή / 8
Φύλλωμα – ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7,5
Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y
Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6,5
Εμφάνιση φλοιού: αρκετά πτωχή / 5
Σχήμα κονδύλου: στρογγυλό οβάλ / RO
Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7
Κονδυλοποίηση: κανονική / 6
Μέγεθος κονδύλου: αρκετά μεγάλο / 7,5
Κανονικότητα μεγέθους: κανονικό / 7
Λήθαργος: μέτριος / 6

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6,5
Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ευαίσθητη / 5,5
Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαίσθητη / 6
Μηχανικοί χειρισμοί: πολύ ευαίσθητη / 4,5
Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: ελάχιστα ευαίσθητη / 7
Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: ελάχιστα ευαίσθητη / 7
Βάρος εντός νερού: 450
Στερεά ουσία: 24,1%
Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): μαλακή / BC
Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6
Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6
Κατανομή στερεάς ουσίας: καλή / 7
Ποιότητα τσιπς: εξαιρετική / 8

AGRICO

Η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ, δεν είναι υπεύθυνοι για ζημιές σχετιζόμενες με τη χρήση των πληροφοριών του παρόντος, δεδομένου ότι σε κάθε χώρα, η καλλιέργεια επηρεάζεται από διαφορετικές κλιματικές, εδαφολογικές και λοιπές τοπικές συνθήκες, καλλιεργητικούς τρόπους, συμβουλές και συνήθειες.

Οδηγίες καλλιέργειας

Λίπανση [1]

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία –10%.
Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.
Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία +20%.

Μεταχείριση σπόρου

Το σπάσιμο του κύριου φύτρου και η σωστή προβλάστηση είναι ιδανική μέθοδος.Να αποφεύγεται σπάσιμο των φύτρων, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

Αποστάσεις φύτευσης

30/40 mm: 25 cm (54.000 φυτά/10 στρ.)
40/50 mm: 33 cm (40.000 φυτά/10 στρ.)
50/60 mm: 38 cm (35.000 φυτά/10 στρ.)

[1] Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους

Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), δεν προκαλεί πρόβλημα στο φύλλωμα ή μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Συνιστάται προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου.

Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης - .

Για βιομηχανική χρήση, να μην αποθηκεύεται κάτω από τους 9 ºC. Κατάλληλη για μέσο ή μεγάλο χρόνο αποθήκευσης.



Say potato, say Agrico.

Ανθεκτικότητες

Ίωση – LRV: - / -
Ίωση – Yn: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8
Ίωση – Yntn (κονδύλου): ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8
Ίωση- Spraing: ευαίσθητη / 5
Περονόσπορος φύλλων: ελάχιστα ευαίσθητη / 6
Περονόσπορος κονδύλων: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5
Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5
Ακτινομύκωση: ελάχιστα ευαίσθητη / 6
Σπογγοσπορίωση: - / -
Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ελάχιστα ευαίσθητη / 6
Καρκίνωση 1: ανθεκτική / 10
Καρκίνωση 6: - / -
Καρκίνωση 18: - / -
Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9
Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -
Νηματώδης Pa2: ευαίσθητη / 4
Νηματώδης Pa3: ευαίσθητη / 2

AGRICO
Τεχνοφάρμα Α.Ε. • Προμπονά 24 • Αθήνα 111 43 τηλ: 210 25 16 185
technofa@otenet.gr www.agricopotatoes.gr