

Fontane.

Μεσοόψιμη, υψηλής απόδοσης, ιδανική για τηγάνι και βιομηχανική επεξεργασία (προτηγανισμένες, κοπτήρια), μεγάλη αποθήκευση.



Βιομηχανικές
Προτηγανισμένες/τηγάνι
Τσιπς
Νιφάδες

- ▶ **Ομοιόμορφοι κόνδυλοι**
- ▶ **Υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά ουσία, κατάλληλη για πολλούς τύπους εδαφών**
- ▶ **Καλή αντοχή σε ιώσεις, ακτινομύκωση και ανθεκτική στους νηματώδεις Ro 1/4**



the
ORIGINAL

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: Lantmännen Seed B.V.
Διασταύρωση: AGRIA x AR 76-034-03
Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2028
Σπορόφυτο: SW 87-1140

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοόψιμη / 5,5
Χρώμα φύτρου: μπλέ βιολετί / BV
Χρώμα άνθους: λευκό / W
Αριθμός μούρων: άνω του κανονικού / 5
Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7,5
Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: κανονική / 7
Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7
Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y
Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6,5
Εμφάνιση φλοιού: αρκετά πτωχή / 5
Σχήμα κονδύλου: οβάλ / O
Ομοιομορφία κονδύλων: αρκετά κανονικό / 6,5
Κονδυλοποίηση: αρκετά υψηλή / 7
Μέγεθος κονδύλου: αρκετά μεγάλο / 7
Κανονικότητα μεγέθους: αρκετά κανονικό / 6
Λήθαργος: αρκετά σύντομος / 5,5

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6
Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: αρκετά ευαίσθητη / 6
Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαίσθητη / 6
Μηχανικοί χειρισμοί: αρκετά ευαίσθητη / 6
Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8
Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8
Βάρος εντός νερού: 430
Στερεά ουσία: 23,2%
Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): μαλακή / BC
Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6,5
Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: ευαίσθητη / 5,5
Κατανομή στερεάς ουσίας: κανονική / 6,5
Ποιότητα τσιπς: κανονική / 6

Οδηγίες καλλιέργειας

Λίπανση ¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία +30%. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οργανική λίπανση.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία +10%.

Μεταχείριση σπόρου

Μπορεί να φυτευτεί κατ' ευθείαν από την ψύξη, μετά από σύντομο θερμικό σοκ. Εάν απαιτηθεί σπάσιμο των φύτρων, δεν πρέπει να γίνει πάνω από δύο φορές, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

Αποστάσεις φύτευσης

28/35 mm: 27 cm (50.000 φυτά/10 στρ.)

35/55 mm: 33 cm (40.000 φυτά/10 στρ.)

50/55 mm: 40 cm (33.000 φυτά/10 στρ.)

¹ Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους

Ζιζάνια

Η ενδεχόμενη χρήση του metribuzin (Sencor), δεν προκαλεί πρόβλημα στο φύλλωμα ή μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Αυστηρό προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου είναι απαραίτητο.

Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης -

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 °C. Για βιομηχανική χρήση, να μην αποθηκεύεται κάτω από τους 7 °C. Κατάλληλη για μεγάλο χρόνο αποθήκευσης.



Say potato,
say Agrico.

Ανθεκτικότητες

Ίωση - LRV: ελάχιστη ευαίσθητη / 6

Ίωση - Yn: ευαίσθητη / 5,5

Ίωση - Yntn (κονδύλου): ελάχιστη ευαίσθητη / 7

Ίωση- Spreng: ελάχιστη ευαίσθητη / 6,5

Περονόσπορος φύλλων: ευαίσθητη / 5

Περονόσπορος κονδύλων: ελάχιστη ευαίσθητη / 6,5

Φουζάριο: ελάχιστη ευαίσθητη / 6

Ακτινομύκωση: ελάχιστη ευαίσθητη / 6

Σπογγόσπορωση: ελάχιστη ευαίσθητη / 6

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: - / -

Καρκίνωση 1: αρκετά ευαίσθητη / 6

Καρκίνωση 6: μέτρια ευαίσθητη / 8

Καρκίνωση 18: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -