

Paradiso.



Γενικής
Χρήσης

Μεσοόψιμη, υψηλής απόδοσης,
κατάλληλη για γενική χρήση.

Image:

- ▶ **Υψηλές αποδόσεις, μεγάλοι ομοιόμορφοι κόνδυλοι**
- ▶ **Εξαιρετική εμφάνιση, ιδανική για φούρνο**
- ▶ **Καλή αντοχή στους μηχανικούς χειρισμούς**

characteristics

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: M. Pot & M. Klaver

Διασταύρωση: RODEO x VALOR

Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2048

Σπορόφυτο: PK 06-0108

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοόψιμη / 6

Χρώμα φύτρου: κόκκινο / R

Χρώμα άνθους: μωβ / P

Αριθμός μούρων: κάτω του κανονικού / 6,5

Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7,5

Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: αρκετά καλή / 7,5

Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7

Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y

Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6

Εμφάνιση φλοιού: καλή / 7

Σχήμα κονδύλου: οβαλ μακρύ / OL

Ομοιομορφία κονδύλων: αρκετά κανονικό / 6,5

Κονδυλοποίηση: κανονική / 6

Μέγεθος κονδύλου: μεγάλο / 8

Κανονικότητα μεγέθους: αρκετά κανονικό / 6,5

Λήθαργος: μέτριος / 6

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Μηχανικοί χειρισμοί: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Βάρος εντός νερού: 329

Στερεά ουσία: 18,2%

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): ελαφρά μαλακή / B

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: - / -

Κατανομή στερεάς ουσίας: - / -

Ποιότητα τσιπς: ακατάλληλη / 4

How to grow



Λίπανση ¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία -20%. Κατά προτίμηση σε χωριστές εφαρμογές, η δεύτερη λίγο μετά την έναρξη κονδυλοποίησης.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία.

Μεταχείριση σπόρου

Να αποφεύγεται σπάσιμο των φύτρων, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

Planting distance

28/35 mm: 23 cm (58.000 φυτά/10 στρ.)

35/55 mm: 33 cm (40.000 φυτά/10 στρ.)

Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), δεν προκαλεί πρόβλημα στο φύλλωμα ή μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Συνιστάται προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου.

Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης - .

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 4 °C. Κατάλληλη για μέσο χρόνο αποθήκευσης.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Ανθεκτικότητες

Ίωση - LRV: - / -

Ίωση - Yn: ελάχιστη ευαίσθητη / 6

Ίωση - Yntn (κονδύλου): ελάχιστη ευαίσθητη / 7,5

Ίωση- Spraing: πολύ ευαίσθητη / 4

Περονόσπορος φύλλων: ευαίσθητη / 5,5

Περονόσπορος κονδύλων: ελάχιστη ευαίσθητη / 6,5

Φουζάριο: ευαίσθητη / 5

Ακτινομύκωση: ευαίσθητη / 5,5

Σπογγοσπορίωση: ελάχιστη ευαίσθητη / 7,5

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ευαίσθητη / 5,5

Καρκίνωση 1: ανθεκτική / 10

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -