

# Spunta.

Μεσοόψιμη ποικιλία γενικής χρήσης, καλή προσαρμοστικότητα στις κλιματολογικές συνθήκες.



Γενικής  
Χρήσης

Image:

- ▶ **Καλές αποδόσεις, μεγάλοι μακρείς κόνδυλοι**
- ▶ **Καλή αντοχή στη ζέστη και στις ιώσεις**
- ▶ **Καλή περιεκτικότητα σε στερεά ουσία**

## characteristics

### Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: J. Oldenburger  
Διασταύρωση: BEA x USDA 96-56  
Δικαιώματα δημιουργού: Έληξαν  
Σπορόφυτο: Oldenburger 57-88

### Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοόψιμη / 6  
Χρώμα φύτρου: μπλέ βιολετί / BV  
Χρώμα άνθους: λευκό / W  
Αριθμός μούρων: κάτω του κανονικού / 6,5  
Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: γρήγορη / 8  
Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: καλή / 8  
Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7,5  
Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y  
Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6  
Εμφάνιση φλοιού: μέτρια / 6  
Σχήμα κονδύλου: μακρύ / L  
Ομοιομορφία κονδύλων: αρκετά κανονικό / 6  
Κονδυλοποίηση: κανονική / 6  
Μέγεθος κονδύλου: μεγάλο / 8  
Κανονικότητα μεγέθους: κανονικό / 7  
Λήθαργος: μέτριος / 6

### Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6  
Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα ευαίσθητη / 7  
Σκασίματα μεγέθους: ελάχιστα ευαίσθητη / 7  
Μηχανικοί χειρισμοί: πολύ ευαίσθητη / 4  
Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8  
Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8  
Βάρος εντός νερού: 387  
Στερεά ουσία: 21%  
Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): μαλακή / BC  
Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6,5  
Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: - / -  
Κατανομή στερεάς ουσίας: - / -  
Ποιότητα τσιπς: κάτω του κανονικού / 5,5

# How to grow



## Λίπανση <sup>1</sup>

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία -10%.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία +10%.

## Μεταχείριση σπόρου

Το σπάσιμο του κύριου φύτρου και η σωστή προβλάστηση είναι ιδανική μέθοδος. Εάν απαιτηθεί σπάσιμο των φύτρων, δεν πρέπει να γίνει πάνω από μία φορά, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

## Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 φυτά/10 στρ.)

35/55 mm: 33 cm (40.000 φυτά/10 στρ.)

## Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), δεν προκαλεί πρόβλημα στο φύλλωμα ή μείωση της παραγωγής.

## Μυκητοκτόνα

Συνιστάται προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου.

## Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

## Θερμοκρασία αποθήκευσης - .

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 °C. Κατάλληλη για μέσο χρόνο αποθήκευσης.

Image:

Say potato,  
say Agrico.

## Ανθεκτικότητες

Ίωση - LRV: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ίωση - Yn: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ίωση - Yntn (κονδύλου): ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ίωση- Spraing: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Περονόσπορος φύλλων: ευαίσθητη / 5,5

Περονόσπορος κονδύλων: ευαίσθητη / 5

Φουζάριο: ευαίσθητη / 5,5

Ακτινομύκωση: ευαίσθητη / 5

Σπογγοσπορίωση: ευαίσθητη / 5

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: - / -

Καρκίνωση 1: ανθεκτική / 10

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: ευαίσθητη / 2

Νηματώδης Pa3: ευαίσθητη / 2