

# Twinner.

Πρώιμη, κατάλληλη και για βιολογική καλλιέργεια, ανθεκτική στον περονόσπορο και στους νηματώδεις Ro 1/4



**Βιολογική  
καλλιέργεια**



**Ειδικής  
Χρήσης  
Για  
τυποποίηση**



**Γενικής  
Χρήσης**

- ▶ **Μεγάλοι οβάλ κόνδυλοι, με κίτρινο χρώμα σάρκας**
- ▶ **Εξαιρετική εμφάνιση, καλές αποδόσεις**
- ▶ **Για όλους τους τύπους μαγειρέματος**

Image:

## characteristics

### Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: G.W. te Winkel  
Διασταύρωση: MA 98-0032 x AR 00-87-22  
Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2046  
Σπορόφυτο: TW 07-0807

### Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: πρώιμη / 7,5  
Χρώμα φύτρου: κόκκινο βιολετί / RV  
Χρώμα άνθους: λευκό / W  
Αριθμός μούρων: υψηλός / 4,5  
Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7,5  
Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: κανονική / 7  
Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7  
Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y  
Χρώμα σάρκας: κίτρινο / 7  
Εμφάνιση φλοιού: καλή / 7  
Σχήμα κονδύλου: οβάλ / O  
Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7  
Κονδυλοποίηση: αρκετά χαμηλή / 5  
Μέγεθος κονδύλου: αρκετά μεγάλο / 7,5  
Κανονικότητα μεγέθους: αρκετά κανονικό / 6,5  
Λήθαργος: μέτριος / 6

### Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6,5  
Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5  
Σκασίματα μεγέθους: ελάχιστα ευαίσθητη / 7  
Μηχανικοί χειρισμοί: αρκετά ευαίσθητη / 6,5  
Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5  
Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: ευαίσθητη / 5,5  
Βάρος εντός νερού: 359  
Στερεά ουσία: 19,7%  
Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): ελαφρά σφικτή / AB  
Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6,5  
Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6  
Κατανομή στερεάς ουσίας: εξαιρετική / 8  
Ποιότητα τσιπς: ακατάλληλη / 5

# How to grow



## Λίπανση <sup>1</sup>

**Άζωτο:** συνηθισμένη δοσολογία +15%. Κατά προτίμηση σε χωριστές εφαρμογές, η δεύτερη λίγο μετά την έναρξη κονδυλοποίησης.

**Φώσφορος:** συνηθισμένη δοσολογία.

**Κάλιο:** συνηθισμένη δοσολογία.

## Μεταχείριση σπόρου

Μπορεί να φυτευτεί κατ' ευθείαν από την ψύξη, μετά από σύντομο θερμικό σοκ. Συνιστάται φύτευση σε ζεστό έδαφος, καθώς η αρχική ανάπτυξη είναι αργή.

## Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 φυτά/10 στρ.)

35/50 mm: 25 cm (54.000 φυτά/10 στρ.)

## Ζιζάνια

Η χρήση του metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά μπορεί να επηρεάσει ελαφρώς το φύλλωμα και να προκαλέσει κάποια μείωση της παραγωγής.

## Μυκητοκτόνα

Παρά την ανθεκτικότητα στον περονόσπορο, χρειάζεται επαγρύπνηση για προσβολές.

## Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

## Θερμοκρασία αποθήκευσης - .

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 °C. Κατάλληλη για μέσο χρόνο αποθήκευσης.

Image:

Say potato,  
say Agrico.

## Ανθεκτικότητες

Ίωση - LRV: - / -

Ίωση - Yn: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Ίωση - Yntn (κονδύλου): ευαίσθητη / 5

Ίωση- Spraing: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Περονόσπορος φύλλων: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Περονόσπορος κονδύλων: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 9

Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ακτινομύκωση: ευαίσθητη / 5,5

Σπογγοσπορίωση: πολύ ευαίσθητη / 4

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Καρκίνωση 1: ανθεκτική / 10

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -