CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Twinner.

Πρώιμη, κατάλληλη και για βιολογική καλλιέργεια, ανθεκτική στον περονόσπορο και στους νηματώδεις Ro 1/4

- **Μεγάλοι οβάλ κόνδυλοι, με κίτρινο χρώμα σάρκας**
- **Εξαιρετική εμφάνιση, καλές αποδόσεις**
- **Για όλους τους τύπους μαγειρέματος**

Βιολογική καλλιέργεια

Ειδικής Χρήσης Για τυποποίηση

Γενικής Χρήσης

Image:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: G.W. te Winkel
Διασταύρωση: MA 98-0032 x AR 00-87-22
Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2046
Σπορόφυτο: TW 07-0807

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: πρώιμη / 7,5
Χρώμα φύτρου: κόκκινο βιολετί / RV
Χρώμα άνθους: λευκό / W
Αριθμός μούρων: υψηλός / 4,5
Φύλλωμα – αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7,5
Φύλλωμα – τελική ανάπτυξη: κανονική / 7
Φύλλωμα – ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7
Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y
Χρώμα σάρκας: κίτρινο / 7
Εμφάνιση φλοιού: καλή / 7
Σχήμα κονδύλου: οβάλ / O
Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7
Κονδυλοποίηση: αρκετά χαμηλή / 5
Μέγεθος κονδύλου: αρκετά μεγάλο / 7,5
Κανονικότητα μεγέθους: αρκετά κανονικό / 6,5
Λήθαργος: μέτριος / 6

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6,5
Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5
Σκασίματα μεγέθους: ελάχιστα ευαίσθητη / 7
Μηχανικοί χειρισμοί: αρκετά ευαίσθητη / 6,5
Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5
Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: ευαίσθητη / 5,5
Βάρος εντός νερού: 359
Στερεά ουσία: 19,7%
Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): ελαφρά σφικτή / AB
Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6,5
Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6
Κατανομή στερεάς ουσίας: εξαιρετική / 8
Ποιότητα τσιπς: ακατάλληλη / 5

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

AGRICO

CULTIVATION RECOMMENDATION

Οδηγίες καλλιέργειας

Λίπανση [1]

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία +15%.Κατά προτίμηση σε χωριστές εφαρμογές, η δεύτερη λίγο μετά την έναρξη κονδυλοποίησης.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία.

Μεταχείριση σπόρου

Μπορεί να φυτευτεί κατ□ ευθείαν από την ψύξη, μετά από σύντομο θερμικό σοκ.Συνιστάται φύτευση σε ζεστό έδαφος, καθώς η αρχική ανάπτυξη είναι αργή.

Αποστάσεις φύτευσης

28/35 mm: 22 cm (60.500 φυτά/10 στρ.)
35/50 mm: 25 cm (54.000 φυτά/10 στρ.)

Ζιζάνια

Η χρήση του metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά μπορεί να επηρεάσει ελαφρώς το φύλλωμα και να προκαλέσει κάποια μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Παρά την ανθεκτικότητα στον περονόσπορο, χρειάζεται επαγρύπνηση για προσβολές.

Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης - .

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 ºC. Κατάλληλη για μέσο χρόνο αποθήκευσης.

Image:

Say potato, say Agrico.

Ανθεκτικότητες

Ίωση – LRV: - / -

Ίωση – Yn: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Ίωση – Yntn (κονδύλου): ευαίσθητη / 5

Ίωση- Spraing: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Περονόσπορος φύλλων: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Περονόσπορος κονδύλων: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 9

Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ακτινομύκωση: ευαίσθητη / 5,5

Σπογγοσπορίωση: πολύ ευαίσθητη / 4

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Καρκίνωση 1: ανθεκτική / 10

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com