CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Twister.

Μεσοπρώιμη, γενικής χρήσης, καλή απόδοση και ανθεκτική στον περονόσπορο. Κατάλληλη και για βιολογική καλλιέργεια.

- **Όμορφη εμφάνιση**
- **Καλή αποθήκευση**
- **Εξαιρετικό τηγάνι**

Βιολογική καλλιέργεια

Ειδικής Χρήσης Για τυποποίηση

Γενικής Χρήσης

Image:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: G.W. te Winkel
Διασταύρωση: ARG 96-0739 x AR 02-9113
Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2048
Σπορόφυτο: TW 08-1507

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοπρώιμη / 7
Χρώμα φύτρου: κόκκινο βιολετί / RV
Χρώμα άνθους: ανοικτό μωβ / LP
Αριθμός μούρων: άνω του κανονικού / 5,5
Φύλλωμα – αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7
Φύλλωμα – τελική ανάπτυξη: αρκετά καλή / 7,5
Φύλλωμα – ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7
Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y
Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6,5
Εμφάνιση φλοιού: καλή / 7
Σχήμα κονδύλου: στρογγυλό οβάλ / RO
Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7
Κονδυλοποίηση: κανονική / 6,5
Μέγεθος κονδύλου: αρκετά μεγάλο / 7
Κανονικότητα μεγέθους: αρκετά κανονικό / 6,5
Λήθαργος: αρκετά μακρύς / 7

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6,5
Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8
Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαίσθητη / 6,5
Μηχανικοί χειρισμοί: ελάχιστα ευαίσθητη / 7
Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: πολύ ευαίσθητη / 3
Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: πολύ ευαίσθητη / 3
Βάρος εντός νερού: 345
Στερεά ουσία: 19%
Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): ελαφρά σφικτή / AB
Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6,5
Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6
Κατανομή στερεάς ουσίας: - / -
Ποιότητα τσιπς: ακατάλληλη / 4

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

AGRICO

CULTIVATION RECOMMENDATION

Οδηγίες καλλιέργειας

Λίπανση [1]

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία +20%.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία.

Μεταχείριση σπόρου

Μπορεί να φυτευτεί κατ□ ευθείαν από την ψύξη, μετά από σύντομο θερμικό σοκ.Προαιρετικό σπάσιμο των φύτρων μια φορά.

Αποστάσεις φύτευσης

28/35 mm: 22 cm (60.500 φυτά/10 στρ.)

35/50 mm: 25 cm (54.000 φυτά/10 στρ.)

Ζιζάνια

Να μη χρησιμοποιείται metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά, καθώς επηρεάζει σημαντικά το φύλλωμα και προκαλεί σημαντική μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Παρά την ανθεκτικότητα στον περονόσπορο, χρειάζεται επαγρύπνηση για προσβολές.

Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης - .

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 6 ºC. Κατάλληλη για μέσο ή μεγάλο χρόνο αποθήκευσης.

Image:

Say potato, say Agrico.

Ανθεκτικότητες

Ίωση – LRV: - / -

Ίωση – Yn: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Ίωση – Yntn (κονδύλου): ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Ίωση- Spraing: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Περονόσπορος φύλλων: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 9

Περονόσπορος κονδύλων: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 9

Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ακτινομύκωση: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Σπογγοσπορίωση: ευαίσθητη / 5

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Καρκίνωση 1: μέτρια ευαίσθητη / 8

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com