

# Twister.

Μεσοπρώιμη, γενικής χρήσης, καλή απόδοση και ανθεκτική στον περονόσπορο. Κατάλληλη και για βιολογική καλλιέργεια.



Image:

- ▶ Όμορφη εμφάνιση
- ▶ Καλή αποθήκευση
- ▶ Εξαιρετικό τηγάνι

## characteristics

### Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: G.W. te Winkel  
Διασταύρωση: ARG 96-0739 x AR 02-9113  
Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2048  
Σπορόφυτο: TW 08-1507

### Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοπρώιμη / 7  
Χρώμα φύτρου: κόκκινο βιολετί / RV  
Χρώμα άνθους: ανοικτό μωβ / LP  
Αριθμός μούρων: άνω του κανονικού / 5,5  
Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7  
Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: αρκετά καλή / 7,5  
Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7  
Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y  
Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6,5  
Εμφάνιση φλοιού: καλή / 7  
Σχήμα κονδύλου: στρογγυλό οβάλ / RO  
Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7  
Κονδυλοποίηση: κανονική / 6,5  
Μέγεθος κονδύλου: αρκετά μεγάλο / 7  
Κανονικότητα μεγέθους: αρκετά κανονικό / 6,5  
Λήθαργος: αρκετά μακρύς / 7

### Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6,5  
Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8  
Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαίσθητη / 6,5  
Μηχανικοί χειρισμοί: ελάχιστα ευαίσθητη / 7  
Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: πολύ ευαίσθητη / 3  
Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: πολύ ευαίσθητη / 3  
Βάρος εντός νερού: 345  
Στερεά ουσία: 19%  
Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): ελαφρά σφικτή / AB  
Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6,5  
Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6  
Κατανομή στερεάς ουσίας: - / -  
Ποιότητα τσιπς: ακατάλληλη / 4

# How to grow



## Λίπανση <sup>1</sup>

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία +20%.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία.

## Μεταχείριση σπόρου

Μπορεί να φυτευτεί κατ' ευθείαν από την ψύξη, μετά από σύντομο θερμικό σοκ. Προαιρετικό σπάσιμο των φύτρων μια φορά.

## Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 φυτά/10 στρ.)

35/50 mm: 25 cm (54.000 φυτά/10 στρ.)

## Ζιζάνια

Να μη χρησιμοποιείται metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά, καθώς επηρεάζει σημαντικά το φύλλωμα και προκαλεί σημαντική μείωση της παραγωγής.

## Μυκητοκτόνα

Παρά την ανθεκτικότητα στον περονόσπορο, χρειάζεται επαγρύπνηση για προσβολές.

## Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

## Θερμοκρασία αποθήκευσης - .

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 6 °C. Κατάλληλη για μέσο ή μεγάλο χρόνο αποθήκευσης.

Image:

Say potato,  
say Agrico.

## Ανθεκτικότητες

Ίωση - LRV: - / -

Ίωση - Υη: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Ίωση - Υηη (κονδύλου): ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Ίωση- Spraing: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Περονόσπορος φύλλων: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 9

Περονόσπορος κονδύλων: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 9

Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ακτινομύκωση: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Σπογγοσπορίωση: ευαίσθητη / 5

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Καρκίνωση 1: μέτρια ευαίσθητη / 8

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -