


Armedi.



Βιομηχανικές
Προτηγανισμένες/τηγάνι

Μεσοόψιμη με μεγάλους οβάλ-μακρείς κονδύλους, υψηλής απόδοσης, ιδανική για τηγάνι και βιομηχανική επεξεργασία (προτηγανισμένες, κοπτήρια).

- ▶ **Καλή κονδυλοποίηση**
- ▶ **Μακρύς χρόνος αποθήκευσης**
- ▶ **Ανθεκτική στους νηματώδεις**



characteristics

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: Agrico Research B.V.

Διασταύρωση: TOPAS x BASIN RUSSET

Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2051

Σπορόφυτο: AR 10-2432

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοόψιμη / 5,5

Χρώμα φύτρου: - / -

Χρώμα άνθους: μωβ / Ρ

Αριθμός μούρων: κανονικός / 6

Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7

Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: καλή / 8

Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: συμπαγής / 8

Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Υ

Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6

Εμφάνιση φλοιού: μέτρια / 6

Σχήμα κονδύλου: οβαλ μακρύ / OL

Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7

Κονδυλοποίηση: κανονική / 6,5

Μέγεθος κονδύλου: αρκετά μεγάλο / 7,5

Κανονικότητα μεγέθους: αρκετά κανονικό / 6,5

Λήθαργος: μέτριος / 6,5

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Σκασίματα μεγέθους: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Μηχανικοί χειρισμοί: πολύ ευαίσθητη / 4,5

Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: πολύ ευαίσθητη / 3

Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: πολύ ευαίσθητη / 3

Βάρος εντός νερού: 402

Στερεά ουσία: 21,8%

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): μαλακή / C

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Κατανομή στερεάς ουσίας: κανονική / 6,5

Ποιότητα τσιπς: καλή / 7



How to grow

Λίπανση ¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία -5%.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία +25%.

Μεταχείριση σπόρου

Συνιστάται σύντομο θερμικό σοκ ή σωστή προβλάστηση. Εάν απαιτηθεί σπάσιμο των φύτρων, δεν πρέπει να γίνει πάνω από μία φορά, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (55.000 φυτά/10 στρ.)

35/55 mm: 34 cm (40.000 φυτά/10 στρ.)

¹ Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους

Ζιζάνια

Να μη χρησιμοποιείται metribuzin (Sencor) μεταφύτευτικά, καθώς επηρεάζει σημαντικά το φύλλωμα και προκαλεί σημαντική μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Αυστηρό προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου είναι απαραίτητο.

Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης -

Για βιομηχανική χρήση, να μην αποθηκεύεται κάτω από τους 7 °C. Κατάλληλη για μεγάλο χρόνο αποθήκευσης.



Ανθεκτικότητες

Ίωση - LRV: - / -

Ίωση - Υn: πολύ ευαίσθητη / 4,5

Ίωση - Υntn (κονδύλου): - / -

Ίωση- Spreaing: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Περονόσπορος φύλλων: πολύ ευαίσθητη / 4

Περονόσπορος κονδύλων: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ακτινομύκωση: ευαίσθητη / 5,5

Say potato,
say **Agrico.**

Σπογγοσπορίωση: ευαίσθητη / 5,5

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ευαίσθητη / 5,5

Καρκίνωση 1: ελάχιστα ευαίσθητη / 9

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: ανθεκτική / 7

Νηματώδης Pa2: ανθεκτική / 9

Νηματώδης Pa3: ανθεκτική / 8