


Fajah.

A strong ware potato variety with regular large tubers with a relatively high dry matter content.



- » **Large tubers and high yield**
- » **Long oval tubers and uniform in size**
- » **Short dormancy, suitable for second crop**



characteristics

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: R. Rispens

Διασταύρωση: LANORMA x AMBITION

Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2052

Σπορόφυτο: RP 10-1003

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοόψιμη / 5,5

Χρώμα φύτρου: κόκκινο / R

Χρώμα άνθους: λευκό / W

Αριθμός μούρων: κάτω του κανονικού / 7

Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: γρήγορη / 8

Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: καλή / 8

Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7,5

Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y

Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6

Εμφάνιση φλοιού: άνω του μετρίου / 6,5

Σχήμα κονδύλου: μακρύ οβάλ / LO

Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7

Κονδυλοποίηση: κανονική / 6

Μέγεθος κονδύλου: αρκετά μεγάλο / 7,5

Κανονικότητα μεγέθους: αρκετά κανονικό / 6,5

Λήθαργος: αρκετά σύντομος / 5,5

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Μηχανικοί χειρισμοί: ευαίσθητη / 5

Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Βάρος εντός νερού: 354

Στερεά ουσία: 19,4%

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): μαλακή / BC

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6

Κατανομή στερεάς ουσίας: - / -

Ποιότητα τσιπς: άνω του κανονικού / 6,5

How to grow

Λίπανση ¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία +10%.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία.

Μεταχείριση σπόρου

Να αποφεύγεται σπάσιμο των φύτρων, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 φυτά/10 στρ.)

35/55 mm: 33 cm (40.000 φυτά/10 στρ.)

Ζιζάνια

Η χρήση του metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά μπορεί να επηρεάσει ελαφρώς το φύλλωμα και να προκαλέσει κάποια μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Αυστηρό προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου είναι απαραίτητο.

Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης - .

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 °C. Κατάλληλη για μέσο χρόνο αποθήκευσης.

¹ Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους



Say potato,
say Agrico.

Ανθεκτικότητες

Ίωση - LRV: - / -

Ίωση - Yn: ευαίσθητη / 5,5

Ίωση - Yntn (κονδύλου): ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Ίωση- Spraing: ευαίσθητη / 5

Περωνόσπορος φύλλων: πολύ ευαίσθητη / 4

Περωνόσπορος κονδύλων: ευαίσθητη / 5,5

Φουζάριο: ευαίσθητη / 5,5

Ακτινομύκωση: ευαίσθητη / 5

Σπογγοσπορίωση: - / -

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ευαίσθητη / 5,5

Καρκίνωση 1: πολύ ευαίσθητη* / 1*

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: ευαίσθητη / 3

Νηματώδης Pa3: ευαίσθητη / 2