
Fajah.

Μεσοόψιμη ποικιλία, γενικής χρήσης, μεγάλοι μακρείς – οβάλ κόνδυλοι, καλή περιεκτικότητα σε στερεά ουσία, κατάλληλη και για τηγάνι.

Γενικής Χρήσης



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: R. Rispens
Διασταύρωση: LANORMA x AMBITION
Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2052
Σπορόφυτο: RP 10-1003

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοόψιμη / 5,5
Χρώμα φύτρου: κόκκινο / R
Χρώμα άνθους: λευκό / W
Αριθμός μούρων: κάτω του κανονικού / 7
Φύλλωμα – αρχική ανάπτυξη: γρήγορη / 8
Φύλλωμα – τελική ανάπτυξη: καλή / 8
Φύλλωμα – ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7,5
Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y
Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6
Εμφάνιση φλοιού: άνω του μετρίου / 6,5
Σχήμα κονδύλου: μακρύ οβάλ / LO
Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7
Κονδυλοποίηση: κανονική / 6
Μέγεθος κονδύλου: μεγάλο / 8
Κανονικότητα μεγέθους: αρκετά κανονικό / 6,5
Λήθαργος: μέτριος / 6

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: ελάχιστα ευαίσθητη / 7
Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα ευαίσθητη / 7
Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαίσθητη / 6,5
Μηχανικοί χειρισμοί: ευαίσθητη / 5
Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: ελάχιστα ευαίσθητη / 7
Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: αρκετά ευαίσθητη / 6,5
Βάρος εντός νερού: 354
Στερεά ουσία: 19,4%
Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): μαλακή / BC
Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6,5
Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6
Κατανομή στερεάς ουσίας: - / -
Ποιότητα τσιπς: άνω του κανονικού / 6,5

Η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ, δεν είναι υπεύθυνοι για ζημιές σχετιζόμενες με τη χρήση των πληροφοριών του παρόντος, δεδομένου ότι σε κάθε χώρα, η καλλιέργεια επηρεάζεται από διαφορετικές κλιματικές, εδαφολογικές και λοιπές τοπικές συνθήκες, καλλιεργητικούς τρόπους, συμβουλές και συνήθειες.

Οδηγίες καλλιέργειας

Λίπανση [1]

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία +10%.
Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.
Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία.

Μεταχείριση σπόρου

Να αποφεύγεται σπάσιμο των φύτρων, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

Αποστάσεις φύτευσης

28/35 mm: 27 cm (50.000 φυτά/10 στρ.)
35/55 mm: 33 cm (40.000 φυτά/10 στρ.)

Ζιζάνια

Η χρήση του metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά μπορεί να επηρεάσει ελαφρώς το φύλλωμα και να προκαλέσει κάποια μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Αυστηρό προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου είναι απαραίτητο.

Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης - .

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 ºC. Κατάλληλη για μέσο χρόνο αποθήκευσης.

[1] Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους



Say potato, say Agrico.

Ανθεκτικότητες

Ίωση – LRV: - / -
Ίωση – Yn: ευαίσθητη / 5,5
Ίωση – Yntn (κονδύλου): ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5
Ίωση- Spraing: ευαίσθητη / 5
Περονόσπορος φύλλων: πολύ ευαίσθητη / 4
Περονόσπορος κονδύλων: ευαίσθητη / 5,5
Φουζάριο: ευαίσθητη / 5,5
Ακτινομύκωση: ευαίσθητη / 5

Σπογγοσπορίωση: - / -
Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ευαίσθητη / 5,5
Καρκίνωση 1: πολύ ευαίσθητη* / 1*
Καρκίνωση 6: - / -
Καρκίνωση 18: - / -
Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9
Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -
Νηματώδης Pa2: ευαίσθητη / 3
Νηματώδης Pa3: ευαίσθητη / 2

AGRICO
Τεχνοφάρμα Α.Ε. • Προμπονά 24 • Αθήνα 111 43 τηλ: 210 25 16 185
technofa@otenet.gr www.agricopotatoes.gr