

Twinner.

Πρώιμη, κατάλληλη και για βιολογική καλλιέργεια, ανθεκτική στον περονόσπορο και στους νηματώδεις Ro 1/4

- » Μεγάλοι οβάλ κόνδυλοι, με κίτρινο χρώμα σάρκας
- » Εξαιρετική εμφάνιση, καλές αποδόσεις
- » Για όλους τους τύπους μαγειρέματος



**Βιολογική
καλλιέργεια**



**Ειδικής
Χρήσης
Για
τυποποίηση**



**Γενικής
Χρήσης**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: G.W. te Winkel

Διασταύρωση: MA 98-0032 x AR 00-87-22

Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2046

Σπορόφυτο: TW 07-0807

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: πρώιμη / 7,5

Χρώμα φύτρου: κόκκινο βιολετί / RV

Χρώμα άνθους: λευκό / W

Αριθμός μούρων: υψηλός / 4,5

Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7,5

Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: κανονική / 7

Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7

Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y

Χρώμα σάρκας: κίτρινο / 7

Εμφάνιση φλοιού: καλή / 7

Σχήμα κονδύλου: οβάλ / O

Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7

Κονδυλοποίηση: αρκετά χαμηλή / 5

Μέγεθος κονδύλου: αρκετά μεγάλο / 7,5

Κανονικότητα μεγέθους: αρκετά κανονικό / 6,5

Λήθαργος: μέτριος / 6

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Σκασίματα μεγέθους: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Μηχανικοί χειρισμοί: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: ευαίσθητη / 5,5

Βάρος εντός νερού: 359

Στερεά ουσία: 19,7%

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): ελαφρά σφικτή / AB

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6

Κατανομή στερεάς ουσίας: εξαιρετική / 8

Ποιότητα σιπς: ακατάλληλη / 5

Οδηγίες καλλιέργειας

Λίπανση ¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία +15%. Κατά προτίμηση σε χωριστές εφαρμογές, η δεύτερη λίγο μετά την έναρξη κονδυλοποίησης.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία.

Μεταχείριση σπόρου

Μπορεί να φυτευτεί κατ' ευθείαν από την ψύξη, μετά από σύντομο θερμικό σοκ. Συνιστάται φύτευση σε ζεστό έδαφος, καθώς η αρχική ανάπτυξη είναι αργή.

Αποστάσεις φύτευσης

28/35 mm: 22 cm (60.500 φυτά/10 στρ.)

35/50 mm: 25 cm (54.000 φυτά/10 στρ.)

¹ Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους

Ζιζάνια

Η χρήση του metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά μπορεί να επηρεάσει ελαφρώς το φύλλωμα και να προκαλέσει κάποια μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Παρά την ανθεκτικότητα στον περονόσπορο, χρειάζεται επαγρύπνηση για προσβολές.

Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την αποψύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης -

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 °C. Κατάλληλη για μέσο χρόνο αποθήκευσης.



Ανθεκτικότητες

Ίωση - LRV: - / -

Ίωση - Yn: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Ίωση - Yntn (κονδύλου): ευαίσθητη / 5

Ίωση- Spreaing: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Περονόσπορος φύλλων: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Περονόσπορος κονδύλων: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 9

Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ακτινομύκωση: ευαίσθητη / 5,5

Say potato,
say **Agrico.**

Σπογγοσπορίωση: πολύ ευαίσθητη / 4

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Καρκίνωση 1: ανθεκτική / 10

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -