

Feliz (SW 14-7008).



**Al por
menor
Ensaladas**

Variedad semitemprana para ensalada, de tubérculos oval alargados, de carne firme a la cocción (tipo A) y alta resistencia al PVY.

- ▶ **Bonita piel**
- ▶ **Tipo de cocción A**
- ▶ **Buena resistencia al PVY**



CARACTERÍSTICAS

Características generales

Obtendor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamiento: LORELEY x SW 06-0296
Derechos de obtendor: Pendiente
Plántula: SW 14-7008

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: semitemprana / 7
Color claro del brote: - / -
Color de la flor: blanca / W
Número de bayas: - / -
Follaje - desarrollo inicial: rápido / 8
Follaje - desarrollo final: bueno / 8
Follaje - firmeza: bastante firme / 7
Color de la piel: amarilla / Y
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: buena / 7
Forma de los tubérculos: oval largo / OL
Regularidad de la forma de los tubérculos: bastante regular / 6,5
Tuberización: alta / 8
Tamaño de los tubérculos: medio / 6,5
Regularidad del tamaño: bastante regular / 6,5
Dormancia: media / 6

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: bastante sensible / 6
Manchas negras (magulladuras internas): ligeramente sensible a no sensible / 8
Grietas de crecimiento: ligeramente sensible / 7
Daños de recolección: ligeramente sensible a no sensible / 8
Metribuzina: ligeramente sensible / 7,5
Metribuzina: ligeramente sensible / 7,5
Etileno: 5% a 15% más tubérculos / 6
Peso bajo agua: 358
Contenido de materia seca: 19,6%
Tipo de cocción: firme / A
Coloración gris (después de la cocción): - / -
Coloración en crudo: muy sensible / 4
Calidad para patatas fritas: - / -
Distribución de la materia seca: - / -
Calidad para chips: - / -
Nivel de TGA: -

CONSEJOS DE CULTIVO



agricopotatoes.ces

Fertilización ¹

Nitrógeno: recomendación estándar. Preferiblemente en tres aplicaciones, con el segundo tratamiento poco después de la tuberización.

Fósforo: recomendación estándar.

Potasio: recomendación estándar.

Tratamiento de semilla

Se recomienda un breve calentamiento de la semilla o una pregerminación adecuada. Quitar los brotes puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

Distancia de plantación

30/50 mm: 20 cm (67.000 plants/ha)

¹ El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.

Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, puede causar alguna reacción en el follaje, pero rara vez una reducción del rendimiento.

Fungicidas

Es necesario un programa estricto de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Temperatura de almacenamiento - Tiempo de almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 4 °C. Adecuada para el almacenamiento a medio



Say potato,
say Agrico.

Resistencias

Virus del enrollado: - / -

Virus - Yn: ligeramente sensible / 7

Virus - Yntn (tubérculo): - / -

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): muy sensible / 4

Mildiu de la hoja: muy sensible / 3,5

Mildiu del tubérculo: sensible / 5,5

Fusarium: - / -

Sarna común: sensible / 5

Sarna pulverulenta: - / -

Antracnosis: - / -

Sarna verrugosa F1: resistente* / 10*

Sarna verrugosa F6: - / -

Sarna verrugosa F18: - / -

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9

Nematodo dorado Ro 2/3: sensible* / 4*

Nematodo blanco Pa 2: moderadamente sensible* / 5*

Nematodo blanco Pa 3: sensible* / 3*