

Texas (AR 14-3488).



Transformación
Patatas fritas

Variedad tardía de alto rendimiento, para la industria de french fries, apta para el cultivo en diferentes tipos de suelo.

- ▶ **Alta producción**
- ▶ **Alto contenido de materia seca**
- ▶ **Múltiples resistencia a la sarna verrugosa**

Picture not yet available



CARACTERÍSTICAS

Características generales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: LEANDRA x AR 07-4113
Derechos de obtentor: Pendiente
Plántula: AR 14-3488

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: semitardía / 5,5
Color claro del brote: - / -
Color de la flor: blanca / W
Número de bayas: medio / 6
Follaje - desarrollo inicial: bastante rápido / 7,5
Follaje - desarrollo final: bueno / 8
Follaje - firmeza: bastante firme / 7,5
Color de la piel: amarilla / Y
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: por debajo de la media / 5,5
Forma de los tubérculos: oval largo / OL
Regularidad de la forma de los tubérculos: regular / 7
Tuberización: media / 6
Tamaño de los tubérculos: bastante grande / 7,5
Regularidad del tamaño: bastante regular / 6,5
Dormancia: media / 6

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: bastante sensible / 6,5
Manchas negras (magulladuras internas): bastante sensible / 6,5
Grietas de crecimiento: bastante sensible / 6,5
Daños de recolección: sensible / 5
Metribuzina: ligeramente sensible / 7
Metribuzina: ligeramente sensible / 7,5
Etileno: - / -
Peso bajo agua: 427
Contenido de materia seca: 23%
Tipo de cocción: harinosa / C
Coloración gris (después de la cocción): ligeramente sensible / 7,5
Coloración en crudo: muy sensible / 4,5
Calidad para patatas fritas: buena / 7
Distribución de la materia seca: media / 6,5
Calidad para chips: - / -
Nivel de TGA: -

CONSEJOS DE CULTIVO



agricopotatoes.ces

Fertilización ¹

Nitrógeno: recomendación estándar. Preferiblemente como aplicación fraccionada, con el segundo tratamiento poco después de la tuberización.

Fósforo: recomendación estándar.

Potasio: recomendación estándar.

Tratamiento de semilla

Se recomienda un breve calentamiento de la semilla o una pregerminación adecuada. Puede plantarse directamente al salir de la cámara frigorífica, preferiblemente después de un breve acondicionamiento térmico de la semilla.

Distancia de plantación

¹ El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.

Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Picture not yet available

Say potato,
say Agrico.

Resistencias

Virus del enrollado: - / -

Virus - Yn: ligeramente sensible / 6,5

Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente sensible / 6

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): muy sensible / 4,5

Mildiu de la hoja: muy sensible / 4

Mildiu del tubérculo: sensible / 5,5

Fusarium: - / -

Sarna común: sensible / 5,5

Sarna pulverulenta: - / -

Antracnosis: - / -

Sarna verrugosa F1: resistente / 10

Sarna verrugosa F6: resistente* / 10*

Sarna verrugosa F18: resistente / 10

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9

Nematodo dorado Ro 2/3: - / -

Nematodo blanco Pa 2: - / -

Nematodo blanco Pa 3: - / -