RECOMENDACIONES DE CULTIVO

Agria.

Variedad tardía de transformación, de carne amarilla, con un buen rendimiento y una calidad muy estable.

- **Excelente calidad para freír**
- **Resistencia a múltiples virus**
- **Buena capacidad de almacenamiento**

Ecológico

Transformación
Patatas fritas
Patatas fritas de bolsa (chips)
Precocinadas

Al por menor
Frescas

Tradicional



Características

Características generales

Obtentor: Böhm
Cruzamiento: QUARTA x SEMLO
Derechos de obtentor: Caducado
Plántula: BM 77-0945

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: tardía / 5
Color claro del brote: azul violeta / BV
Color de la flor: blanca / W
Número de bayas: ninguno / 8
Follaje - desarrollo inicial: bastante rápido / 7
Follaje - desarrollo final: bueno / 8
Follaje - firmeza: bastante firme / 7
Color de la piel: amarilla / Y
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: media / 6
Forma de los tubérculos: oval largo / OL
Regularidad de la forma de los tubérculos: regular / 7
Tuberización: bastante baja / 5
Tamaño de los tubérculos: grande / 8
Regularidad del tamaño: regular / 7
Dormancia: larga / 8

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: bastante sensible / 6
Manchas negras (magulladuras internas): bastante sensible / 6
Grietas de crecimiento: bastante sensible / 6,5
Daños de recolección: sensible / 5
Metribuzina: ligeramente sensible / 7,5
Metribuzina: ligeramente sensible / 7,5
Etileno: 5% a 15% más tubérculos / 6
Peso bajo agua: 402
Contenido de materia seca: 21,8%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Coloración gris (después de la cocción): ligeramente sensible / 7
Coloración en crudo: ligeramente sensible / 7
Calidad para patatas fritas: excelente / 8
Distribución de la materia seca: media / 6,5
Calidad para chips: buena / 7
Nivel de TGA: 2,7 mg/100g

Agrico ha adoptado todas las precauciones razonables para elaborar esta descripción de la variedad. Sin embargo, tenga en cuenta que cualquier información puede estar sujeta a cambios y Agrico no aceptará ninguna responsabilidad, en caso de errores u omisiones. En ninguna circunstancia Agrico será responsable de los daños que surjan de o estén relacionados con la información contenida en esta descripción.

AGRICO

RECOMENDACIONES DE CULTIVO

Consejos de cultivo

agricopotatoes.ces

Fertilización [1]

Nitrógeno: recomendación estándar - 10%.

Fósforo: recomendación estándar.

Potasio: recomendación estándar + 10%.

Tratamiento de semilla

Se recomienda un breve calentamiento de la semilla o una pregerminación adecuada.Una pregerminación adecuada después de quitar el brote apical puede dar un resultado positivo en la formación de los tubérculos.

Distancia de plantación

28/35 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 plantas/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 plantas/ha)

[1] El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.

Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, puede causar alguna reacción en el follaje, pero rara vez una reducción del rendimiento.

Fungicidas

Se recomienda un programa de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos tres semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Temperatura de almacenamiento - Tiempo de almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 5 ºC. Para fines de transformación, no almacenar por debajo de los 7 ºC. Adecuada para el almacenamiento a largo plazo.



Say potato, say Agrico.

Resistencias

Virus del enrrollado: ligeramente sensible / 6

Virus - Yn: ligeramente a no sensible / 8

Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente sensible / 7

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): ligeramente sensible / 7

Mildiu de la hoja: sensible / 5,5

Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7

Fusarium: ligeramente sensible / 6,5

Sarna común: muy sensible / 4,5

Sarna pulverulenta: muy sensible / 3

Antracnosis: - / -

Sarna verrugosa F1: ligeramente sensible / 9

Sarna verrugosa F6: bastante sensible / 6

Sarna verrugosa F18: - / -

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9

Nematodo dorado Ro 2/3: - / -

Nematodo blanco Pa 2: sensible / 2

Nematodo blanco Pa 3: sensible / 2

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.es