

Ailstar.



Transformación
Fécula

Variedad tardía para fécula, con un buen rendimiento de fécula y resistente a varios tipos de la sarna verrugosa de la patata.

Image:

- ▶ **Tubérculos bastante grandes**
- ▶ **Alto contenido de materia seca**
- ▶ **Múltiples resistencias**

Características

Características generales

Obtentor: J.L. Spijkman
Cruzamiento: KURAS x SERESTA
Derechos de obtentor: 31-12-2045
Plántula: SA 05-0204

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: tardía / 4,5
Color claro del brote: azul violeta / BV
Color de la flor: blanca / W
Número de bayas: muy alto / 4
Follaje - desarrollo inicial: bastante rápido / 7
Follaje - desarrollo final: bueno / 8
Follaje - firmeza: bastante firme / 7
Color de la piel: amarilla / Y
Color de la carne: crema / 5
Finura de la piel: bastante pobre / 5
Forma de los tubérculos: redondo oval / RO
Regularidad de la forma de los tubérculos: bastante regular / 6
Tuberización: bastante alta / 7
Tamaño de los tubérculos: bastante grande / 7
Regularidad del tamaño: bastante regular / 6
Dormancia: media / 6

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: bastante sensible / 6
Manchas negras (magulladuras internas): muy sensible / 4
Grietas de crecimiento: ligeramente sensible / 7
Daños de recolección: sensible / 5
Metribuzina: ligeramente sensible a no sensible / 8
Metribuzina: ligeramente sensible / 7,5
Etileno: 15% a 25% más tubérculos / 7
Peso bajo agua: 508
Contenido de materia seca: 27%
Tipo de cocción: harinosa / C
Coloración gris (después de la cocción): muy sensible / 4
Coloración en crudo: - / -
Calidad para patatas fritas: inadecuada / 4
Distribución de la materia seca: - / -
Calidad para chips: inadecuada / 5
Nivel de TGA: 10,1 mg/100g
S_Harvestability: - / -


agricopotatoes.ces

Consejos de cultivo

Fertilización ¹

Nitrógeno: recomendación estándar + 5%. Preferiblemente como aplicación fraccionada, con el segundo tratamiento poco después de la tuberización.

Fósforo: recomendación estándar.

Potasio: recomendación estándar + 20%.

Tratamiento de semilla

Se recomienda un breve calentamiento de la semilla o una pregerminación adecuada. Una pregerminación adecuada después de quitar el brote apical puede dar un resultado positivo en la formación de los tubérculos. Quitar los brotes una vez es opcional.

Distancia de plantación

28/35 mm: 27 cm (50.000 plantas/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plantas/ha)

Allstar tiene estolones largos, por tanto, no hay que plantar esta variedad a gran profundidad.

Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, no causa ninguna reacción en el follaje, ni reducción del rendimiento.

Fungicidas

Se recomienda un programa de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos tres semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Temperatura de almacenamiento - Tiempo de almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 5 °C. Adecuada para el almacenamiento a medio plazo.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Resistencias

Virus del enrollado: - / -

Virus - Yn: ligeramente a no sensible / 8

Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente a no sensible / 9

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): ligeramente sensible / 6

Mildiu de la hoja: ligeramente sensible / 6

Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6,5

Fusarium: - / -

Sarna común: ligeramente sensible / 6

Sarna pulverulenta: ligeramente a no sensible / 8

Antracnosis: - / -

R_PCN Tolerance: - / -

Sarna verrugosa F1: ligeramente sensible / 9

Sarna verrugosa F6: resistente / 10

Sarna verrugosa F18: ligeramente sensible / 9

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9

Nematodo dorado Ro 2/3: sensible / 4

Nematodo blanco Pa 2: moderadamente sensible / 6

Nematodo blanco Pa 3: sensible / 4