

Ardeche.



Ecológico



Transformación

Copos
Fécula

Variedad semitardía para fécula, con un buen rendimiento, resistente al mildiu de la hoja y del tubérculo y adecuada para la producción de copos.

Image:

- ▶ **Buen rendimiento de fécula**
- ▶ **Resistencia múltiple a los nematodos del quiste de la patata**
- ▶ **Buena resistencia a virus**

Características

Características generales

Obtentor: Agrico Research B.V.

Cruzamiento: STAYER x AR 02-2139

Derechos de obtentor: 31-12-2048

Plántula: AR 07-2451

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: semitardía / 5,5

Color claro del brote: verde rojo / GR

Color de la flor: blanca / W

Número de bayas: medio / 6

Follaje - desarrollo inicial: rápido / 8

Follaje - desarrollo final: bueno / 8

Follaje - firmeza: bastante firme / 7,5

Color de la piel: amarilla / Y

Color de la carne: amarilla clara / 6,5

Finura de la piel: muy pobre / 4

Forma de los tubérculos: redondo oval / RO

Regularidad de la forma de los tubérculos: bastante regular / 6,5

Tuberización: bastante baja / 5

Tamaño de los tubérculos: bastante grande / 7,5

Regularidad del tamaño: regular / 7

Dormancia: bastante corta / 5,5

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: bastante sensible / 6

Manchas negras (magulladuras internas): muy sensible / 4,5

Grietas de crecimiento: bastante sensible / 6

Daños de recolección: bastante sensible / 6

Metribuzina: ligeramente sensible a no sensible / 8

Metribuzina: ligeramente sensible a no sensible / 8

Etileno: 15% a 25% más tubérculos / 7

Peso bajo agua: 474

Contenido de materia seca: 25,3%

Tipo de cocción: harinosa / C

Coloración gris (después de la cocción): bastante sensible / 6,5

Coloración en crudo: - / -

Calidad para patatas fritas: inadecuada / 4

Distribución de la materia seca: - / -

Calidad para chips: media / 6

Nivel de TGA: 4,7 mg/100g

S_Harvestability: - / -


agricopotatoes.ces

Consejos de cultivo

Fertilización ¹

Nitrógeno: recomendación estándar + 10%. Puede aplicarse enmienda orgánica.

Fósforo: recomendación estándar.

Potasio: recomendación estándar + 20%.

Tratamiento de semilla

Una pregerminación adecuada después de quitar el brote apical puede dar un resultado positivo en la formación de los tubérculos. Quitar los brotes más de una vez puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

Distancia de plantación

28/35 mm: 21 cm (64.000 plantas/ha)

35/55 mm: 26 cm (50.000 plantas/ha)

¹ El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.

Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, no causa ninguna reacción en el follaje, ni reducción del rendimiento.

Fungicidas

A pesar de la resistencia al mildiu, hay que estar alerta a las infecciones.

Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos tres semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Temperatura de almacenamiento - Tiempo de almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 8 °C. Adecuada para el almacenamiento a medio plazo.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Resistencias

Virus del enrollado: - / -

Virus - Yn: ligeramente sensible / 6

Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente a no sensible / 8,5

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): ligeramente sensible / 6

Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 9

Mildiu del tubérculo: ligeramente a no sensible / 9

Fusarium: - / -

Sarna común: ligeramente sensible / 6

Sarna pulverulenta: ligeramente sensible / 6,5

Antracnosis: ligeramente sensible / 7

R_PCN Tolerance: - / -

Sarna verrugosa F1: moderadamente sensible / 8

Sarna verrugosa F6: moderadamente sensible / 8

Sarna verrugosa F18: - / -

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9

Nematodo dorado Ro 2/3: resistente / 9

Nematodo blanco Pa 2: resistente / 9

Nematodo blanco Pa 3: resistencia de campo / 7