RECOMENDACIONES DE CULTIVO

Arizona.

Variedad semitemprana de consumo que produce altos rendimientos en diversas condiciones climáticas.

- **Cosecha elevada y temprana**
- **Buena tolerancia a la sequía y al calor**
- **Grandes resistencias a virosis**
- **Rinde en cualquier clima**

Tradicional



Características

Características generales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: UK 150-19D22 x MASCOTTE
Derechos de obtentor: 31-12-2040
Plántula: AR 98-0313

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: semitemprana / 7
Color claro del brote: rojo violeta / RV
Color de la flor: blanca / W
Número de bayas: por encima de la media / 5
Follaje - desarrollo inicial: bastante rápido / 7
Follaje - desarrollo final: bueno / 8
Follaje - firmeza: media / 6
Color de la piel: amarilla / Y
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: por encima de la media / 6,5
Forma de los tubérculos: oval / O
Regularidad de la forma de los tubérculos: regular / 7,5
Tuberización: media / 6
Tamaño de los tubérculos: grande / 8
Regularidad del tamaño: regular / 7
Dormancia: media / 6

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: ligeramente sensible / 7
Manchas negras (magulladuras internas): ligeramente sensible / 7
Grietas de crecimiento: ligeramente sensible / 7
Daños de recolección: ligeramente sensible / 7
Metribuzina: sensible / 5
Metribuzina: bastante sensible / 6,5
Etileno: 15% a 25% más tubérculos / 7
Peso bajo agua: 301
Contenido de materia seca: 17%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Coloración gris (después de la cocción): bastante sensible / 6,5
Coloración en crudo: - / -
Calidad para patatas fritas: inadecuada / 4
Distribución de la materia seca: - / -
Calidad para chips: inadecuada / 4
Nivel de TGA: 4,2 mg/100g

Agrico ha adoptado todas las precauciones razonables para elaborar esta descripción de la variedad. Sin embargo, tenga en cuenta que cualquier información puede estar sujeta a cambios y Agrico no aceptará ninguna responsabilidad, en caso de errores u omisiones. En ninguna circunstancia Agrico será responsable de los daños que surjan de o estén relacionados con la información contenida en esta descripción.

AGRICO

RECOMENDACIONES DE CULTIVO

Consejos de cultivo

agricopotatoes.ces

Fertilización [1]

Nitrógeno: recomendación estándar - 10%.
Fósforo: recomendación estándar.
Potasio: recomendación estándar.

Tratamiento de semilla

Quitar los brotes más de una vez puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

Distancia de plantación

28/35 mm: 27 cm (50.000 plantas/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 plantas/ha)

[1] El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.

Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, puede causar alguna reacción en el follaje y alguna reducción del rendimiento.

Fungicidas

Es necesario un programa estricto de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Temperatura de almacenamiento - Tiempo de almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 4 ºC. Adecuada para el almacenamiento a medio plazo.



Say potato, say Agrico.

Resistencias

Virus del enrrollado: - / -
Virus - Yn: ligeramente a no sensible / 8
Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente a no sensible / 8
Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): sensible / 5
Mildiu de la hoja: muy sensible / 4
Mildiu del tubérculo: sensible / 5
Fusarium: ligeramente sensible / 6
Sarna común: sensible / 5,5
Sarna pulverulenta: muy sensible / 2
Antracnosis: muy sensible / 4
Sarna verrugosa F1: resistente / 10
Sarna verrugosa F6: bastante sensible / 6
Sarna verrugosa F18: - / -
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 2/3: - / -
Nematodo blanco Pa 2: - / -
Nematodo blanco Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.es