RECOMENDACIONES DE CULTIVO

Fontane.

Variedad semitardía de transformación, de alto rendimiento, para la producción de patatas fritas y copos.

Transformación
Patatas fritas
Patatas fritas de bolsa (chips)
Copos

- **Tubérculos grandes**
- **Alto contenido de materia seca**
- **Adecuada para diferentes tipos de suelo**

Características

Características generales

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.

Cruzamiento: AGRIA x AR 76-034-03

Derechos de obtentor: 31-12-2028

Plántula: SW 87-1140

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: semitardía / 5,5

Color claro del brote: azul violeta / BV

Color de la flor: blanca / W

Número de bayas: por encima de la media / 5

Follaje - desarrollo inicial: bastante rápido / 7,5

Follaje - desarrollo final: medio / 7

Follaje - firmeza: bastante firme / 7

Color de la piel: amarilla / Y

Color de la carne: amarilla clara / 6,5

Finura de la piel: bastante pobre / 5

Forma de los tubérculos: oval / O

Regularidad de la forma de los tubérculos: bastante regular / 6,5

Tuberización: bastante alta / 7

Tamaño de los tubérculos: bastante grande / 7

Regularidad del tamaño: bastante regular / 6

Dormancia: bastante corta / 5,5

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: bastante sensible / 6

Manchas negras (magulladuras internas): bastante sensible / 6

Grietas de crecimiento: bastante sensible / 6

Daños de recolección: bastante sensible / 6

Metribuzina: ligeramente sensible a no sensible / 8

Metribuzina: ligeramente sensible a no sensible / 8

Etileno: 15% a 25% más tubérculos / 7

Peso bajo agua: 430

Contenido de materia seca: 23,2%

Tipo de cocción: harinosa / BC

Coloración gris (después de la cocción): bastante sensible / 6,5

Coloración en crudo: sensible / 5,5

Calidad para patatas fritas: excelente / 8

Distribución de la materia seca: media / 6,5

Calidad para chips: media / 6

Nivel de TGA: 6,1 mg/100g

Agrico ha adoptado todas las precauciones razonables para elaborar esta descripción de la variedad. Sin embargo, tenga en cuenta que cualquier información puede estar sujeta a cambios y Agrico no aceptará ninguna responsabilidad, en caso de errores u omisiones. En ninguna circunstancia Agrico será responsable de los daños que surjan de o estén relacionados con la información contenida en esta descripción.

AGRICO

RECOMENDACIONES DE CULTIVO

Consejos de cultivo

agricopotatoes.ces

Fertilización [1]

Nitrógeno: recomendación estándar + 30%.Puede aplicarse enmienda orgánica.

Fósforo: recomendación estándar.

Potasio: recomendación estándar + 10%.

Tratamiento de semilla

Puede plantarse directamente al salir de la cámara frigorífica, preferiblemente después de un breve acondicionamiento térmico de la semilla.Quitar los brotes más de dos veces puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

Distancia de plantación

28/35 mm: 27 cm (50.000 plantas/ha)
35/55 mm: 33 cm (40.000 plantas/ha)
50/55 mm: 40 cm (33.000 plantas/ha)

[1] El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.

Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, no causa ninguna reacción en el follaje, ni reducción del rendimiento.

Fungicidas

Es necesario un programa estricto de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos tres semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Temperatura de almacenamiento - Tiempo de almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 5 ºC. Para fines de transformación, no almacenar por debajo de los 7 ºC. Adecuada para el almacenamiento a largo plazo.

Say potato, say Agrico.

Resistencias

Virus del enrrollado: ligeramente sensible / 6

Virus - Yn: sensible / 5,5

Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente sensible / 7

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): ligeramente sensible / 6,5

Mildiu de la hoja: sensible / 5

Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6,5

Fusarium: ligeramente sensible / 6

Sarna común: ligeramente sensible / 6

Sarna pulverulenta: ligeramente sensible / 6

Antracnosis: - / -

Sarna verrugosa F1: bastante sensible / 6

Sarna verrugosa F6: moderadamente sensible / 8

Sarna verrugosa F18: - / -

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9

Nematodo dorado Ro 2/3: - / -

Nematodo blanco Pa 2: - / -

Nematodo blanco Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.es