

Kuras.



Transformación
Fécula

Variedad tardía para la producción de fécula, resistente a los nematodos del quiste de la patata y con un muy buen rendimiento de fécula.

Image:

- ▶ **Carne blanca**
- ▶ **Buena capacidad de almacenamiento**
- ▶ **Buena resistencia a los virus y al mildiu**

Características

Características generales

Obtentor: G. Kuper
Cruzamiento: PG 285 x AR 69-0491
Derechos de obtentor: Caducado
Plántula: KU 80-1271

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: tardía / 4
Color claro del brote: azul violeta / BV
Color de la flor: blanca / W
Número de bayas: muy alto / 4
Follaje - desarrollo inicial: bastante rápido / 7
Follaje - desarrollo final: bastante bueno / 7,5
Follaje - firmeza: bastante firme / 7,5
Color de la piel: amarilla / Y
Color de la carne: blanca / 4,5
Finura de la piel: bastante pobre / 5
Forma de los tubérculos: redondo oval / RO
Regularidad de la forma de los tubérculos: bastante regular / 6
Tuberización: media / 6
Tamaño de los tubérculos: bastante grande / 7,5
Regularidad del tamaño: regular / 7
Dormancia: bastante corta / 5,5

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: bastante sensible / 6
Manchas negras (magulladuras internas): bastante sensible / 6
Grietas de crecimiento: ligeramente sensible / 7
Daños de recolección: sensible / 5,5
Metribuzina: ligeramente sensible / 7
Metribuzina: ligeramente sensible / 7
Etileno: - / -
Peso bajo agua: 490
Contenido de materia seca: 25,9%
Tipo de cocción: harinosa / C
Coloración gris (después de la cocción): muy sensible / 4,5
Coloración en crudo: - / -
Calidad para patatas fritas: por debajo de la media / 5,5
Distribución de la materia seca: - / -
Calidad para chips: inadecuada / 4,5
Nivel de TGA: 33,8 mg/100g
S_Harvestability: - / -


agricopotatoes.ces

Consejos de cultivo

Fertilización ¹

Nitrógeno: recomendación estándar + 5%. Puede aplicarse enmienda orgánica.

Fósforo: recomendación estándar.

Potasio: recomendación estándar + 10%.

Tratamiento de semilla

Una pregerminación adecuada después de quitar el brote apical puede dar un resultado positivo en la formación de los tubérculos. Quitar los brotes más de una vez puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

Distancia de plantación

28/35 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 plantas/ha)

¹ El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.

Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, puede causar alguna reacción en el follaje, pero rara vez una reducción del rendimiento.

Fungicidas

Se recomienda un programa de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Temperatura de almacenamiento - Tiempo de almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 5 °C. Adecuada para el almacenamiento a medio plazo.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Resistencias

Virus del enrollado: ligeramente sensible / 7

Virus - Yn: ligeramente a no sensible / 8

Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente a no sensible / 9

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): ligeramente sensible / 6,5

Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 8

Mildiu del tubérculo: ligeramente a no sensible / 8

Fusarium: ligeramente sensible / 7

Sarna común: sensible / 5,5

Sarna pulverulenta: ligeramente sensible / 6,5

Antracnosis: - / -

R_PCN Tolerance: - / -

Sarna verrugosa F1: resistente / 10

Sarna verrugosa F6: bastante sensible / 5

Sarna verrugosa F18: - / -

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9

Nematodo dorado Ro 2/3: resistente / 9

Nematodo blanco Pa 2: - / -

Nematodo blanco Pa 3: - / -