RECOMENDACIONES DE CULTIVO

Lugano.

Variedad semitardía de transformación, de carne amarilla, con una buena resistencia a los nematodos del quiste de la patata.

- **Tubérculos grandes**
- **Resistencia múltiple**
- **Buena capacidad de almacenamiento**

Transformación
Patatas fritas

Tradicional

characteristics

Características generales

Obtentor: F.J. Vos

Cruzamiento: AR 00-2211 x AR 99-0669

Derechos de obtentor: 31-12-2048

Plántula: VO 07-0289

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: semitardía / 5,5

Color claro del brote: rojo / R

Color de la flor: blanca / W

Número de bayas: por debajo de la media / 7

Follaje - desarrollo inicial: bastante rápido / 7

Follaje - desarrollo final: bueno / 8

Follaje - firmeza: bastante firme / 7,5

Color de la piel: amarilla / Y

Color de la carne: amarilla clara / 6,5

Finura de la piel: media / 6

Forma de los tubérculos: oval largo / OL

Regularidad de la forma de los tubérculos: bastante regular / 6

Tuberización: bastante baja / 5

Tamaño de los tubérculos: grande / 8

Regularidad del tamaño: regular / 7

Dormancia: larga / 8

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: bastante sensible / 6

Manchas negras (magulladuras internas): bastante sensible / 6

Grietas de crecimiento: bastante sensible / 6,5

Daños de recolección: muy sensible / 4,5

Metribuzina: ligeramente sensible a no sensible / 8

Metribuzina: ligeramente sensible / 7,5

Bentazona: ligeramente sensible a no sensible / 8

Etileno: 5% a 15% más tubérculos / 6

Peso bajo agua: 394

Contenido de materia seca: 21,4%

Tipo de cocción: bastante harinosa / B

Coloración gris (después de la cocción): bastante sensible / 6,5

Coloración en crudo: bastante sensible / 6

Calidad para patatas fritas: buena / 7

Distribución de la materia seca: buena / 7,5

Calidad para chips: por debajo de la media / 5,5

Nivel de TGA: 6.4

Agrico ha adoptado todas las precauciones razonables para elaborar esta descripción de la variedad. Sin embargo, tenga en cuenta que cualquier información puede estar sujeta a cambios y Agrico no aceptará ninguna responsabilidad, en caso de errores u omisiones. En ninguna circunstancia Agrico será responsable de los daños que surjan de o estén relacionados con la información contenida en esta descripción.

AGRICO

RECOMENDACIONES DE CULTIVO

How to grow

agricopotatoes.ces

Fertilización [1]

Nitrógeno: recomendación estándar.

Fósforo: recomendación estándar.

Potasio: recomendación estándar + 20%.

Tratamiento de semilla

Puede plantarse directamente al salir de la cámara frigorífica, preferiblemente después de un breve acondicionamiento térmico de la semilla.Quitar los brotes más de dos veces puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.000 plantas/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 plantas/ha)

50/55 mm: 36 cm (37.000 plantas/ha)

[1] El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.

Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, no causa ninguna reacción en el follaje, ni reducción del rendimiento.

Fungicidas

Se recomienda un programa de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos tres semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Temperatura de almacenamiento - Tiempo de almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 5 ºC. Para fines de transformación, no almacenar por debajo de los 7 ºC. Adecuada para el almacenamiento a largo plazo.

Say potato, say Agrico.

Resistencias

Virus del enrrollado: - / -

Virus - Yn: sensible / 5,5

Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente sensible / 7,5

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): sensible / 5,5

Mildiu de la hoja: sensible / 5

Mildiu del tubérculo: sensible / 5,5

Fusarium: ligeramente sensible / 6,5

Sarna común: sensible / 5,5

Sarna pulverulenta: ligeramente sensible / 7,5

Antracnosis: ligeramente sensible / 6

Sarna verrugosa F1: resistente / 10

Sarna verrugosa F6: ligeramente sensible / 9

Sarna verrugosa F18: - / -

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9

Nematodo dorado Ro 2/3: resistente / 9

Nematodo blanco Pa 2: resistente / 9

Nematodo blanco Pa 3: resistente / 9

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.es