RECOMENDACIONES DE CULTIVO

# Manitou.

Variedad tardía de consumo, con una atractiva piel roja y un alto rendimiento.

**Al por menor**
Frescas

**Tradicional**

- **Tubérculos grandes**
- **Buena tolerancia a la sequía**
- **Resistencia múltiple a los nematodos del quiste de la patata**

# characteristics

## Características generales

**Obtentor:** Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.

**Cruzamiento:** LAURA x MARANCA

**Derechos de obtentor:** 31-12-2037

**Plántula:** MA 96-0419

## Características de la planta y del tubérculo

**Madurez:** tardía / 5

**Color claro del brote:** rojo violeta / RV

**Color de la flor:** morada / P

**Número de bayas:** por encima de la media / 5

**Follaje - desarrollo inicial:** bastante rápido / 7

**Follaje - desarrollo final:** bueno / 8

**Follaje - firmeza:** bastante firme / 7

**Color de la piel:** roja / R

**Color de la carne:** amarilla clara / 6

**Finura de la piel:** buena / 7

**Forma de los tubérculos:** largo oval / LO

**Regularidad de la forma de los tubérculos:** bastante regular / 6,5

**Tuberización:** bastante alta / 7

**Tamaño de los tubérculos:** grande / 8

**Regularidad del tamaño:** regular / 7

**Dormancia:** bastante corta / 5,5

## Sensibilidad y calidad

**Crecimiento secundario:** bastante sensible / 6,5

**Manchas negras (magulladuras internas):** ligeramente sensible / 7,5

**Grietas de crecimiento:** bastante sensible / 6

**Daños de recolección:** sensible / 5,5

**Metribuzina:** muy sensible / 4

**Metribuzina:** muy sensible / 3,5

**Bentazona:** ligeramente sensible / 7

**Etileno:** 15% a 25% más tubérculos / 7

**Peso bajo agua:** 351

**Contenido de materia seca:** 19,4%

**Tipo de cocción:** bastante harinosa / B

**Coloración gris (después de la cocción):** ligeramente sensible / 7

**Coloración en crudo:** - / -

**Calidad para patatas fritas:** por debajo de la media / 5,5

**Distribución de la materia seca:** - / -

**Calidad para chips:** inadecuada / 4,5

**Nivel de TGA:** 3,4

Agrico ha adoptado todas las precauciones razonables para elaborar esta descripción de la variedad. Sin embargo, tenga en cuenta que cualquier información puede estar sujeta a cambios y Agrico no aceptará ninguna responsabilidad, en caso de errores u omisiones. En ninguna circunstancia Agrico será responsable de los daños que surjan de o estén relacionados con la información contenida en esta descripción.

AGRICO

RECOMENDACIONES DE CULTIVO

# How to grow

agricopotatoes.ces

## Fertilización [1]

**Nitrógeno:** recomendación estándar.

**Fósforo:** recomendación estándar.

**Potasio:** recomendación estándar + 10%.

## Tratamiento de semilla

Quitar los brotes más de una vez puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

## Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 plantas/ha)

[1] El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.

## Malas hierbas

No usar metribuzina (Sencor) en post-emergencia, ya que causa una reacción grave en el follaje y una reducción importante del rendimiento.

## Fungicidas

Es necesario un programa estricto de tratamientos preventivos contra el mildiu.

## Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos tres semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

## Temperatura de almacenamiento - Tiempo de almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 5 ºC. Adecuada para el almacenamiento a medio plazo.

Say potato, say Agrico.

## Resistencias

**Virus del enrrollado:** - / -

**Virus - Yn:** ligeramente sensible / 6,5

**Virus - Yntn (tubérculo):** ligeramente sensible / 7

**Spraing (Manchas y/o círculos necróticos):** ligeramente sensible / 7

**Mildiu de la hoja:** sensible / 5

**Mildiu del tubérculo:** ligeramente sensible / 6

**Fusarium:** ligeramente sensible / 7

**Sarna común:** ligeramente sensible / 6

**Sarna pulverulenta:** ligeramente sensible / 6

**Antracnosis:** ligeramente sensible / 7

**Sarna verrugosa F1:** resistente / 10

**Sarna verrugosa F6:** - / -

**Sarna verrugosa F18:** - / -

**Nematodo dorado Ro 1/4:** resistente / 9

**Nematodo dorado Ro 2/3:** resistente / 9

**Nematodo blanco Pa 2:** - / -

**Nematodo blanco Pa 3:** - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.es