RECOMENDACIONES DE CULTIVO

# Markies.

Variedad tardía, versátil y de alto rendimiento, para patatas fritas y de bolsa (chips), el sector de comida rápida (QSR) y el consumo en fresco.

**Transformación**
Patatas fritas
Patatas fritas de bolsa (chips)

**Tradicional**

- **Tubérculos grandes**
- **Resistencia múltiple a virus**
- **Buena capacidad de almacenamiento**

# characteristics

## Características generales

**Obtentor:** Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.

**Cruzamiento:** FIANNA x AGRIA

**Derechos de obtentor:** 31-12-2029

**Plántula:** MA 85-0698

## Características de la planta y del tubérculo

**Madurez:** tardía / 4

**Color claro del brote:** azul violeta / BV

**Color de la flor:** blanca / W

**Número de bayas:** por debajo de la media / 6,5

**Follaje - desarrollo inicial:** bastante rápido / 7

**Follaje - desarrollo final:** bueno / 8

**Follaje - firmeza:** firme / 8

**Color de la piel:** amarilla / Y

**Color de la carne:** amarilla clara / 6,5

**Finura de la piel:** buena / 7

**Forma de los tubérculos:** oval largo / OL

**Regularidad de la forma de los tubérculos:** regular / 7

**Tuberización:** media / 6

**Tamaño de los tubérculos:** bastante grande / 7,5

**Regularidad del tamaño:** regular / 7

**Dormancia:** media / 6,5

## Sensibilidad y calidad

**Crecimiento secundario:** bastante sensible / 6

**Manchas negras (magulladuras internas):** ligeramente sensible a no sensible / 8

**Grietas de crecimiento:** ligeramente sensible / 7

**Daños de recolección:** sensible / 5

**Metribuzina:** ligeramente sensible / 7

**Metribuzina:** ligeramente sensible / 7

**Bentazona:** bastante sensible / 6

**Etileno:** 5% a 15% más tubérculos / 6

**Peso bajo agua:** 427

**Contenido de materia seca:** 22,8%

**Tipo de cocción:** harinosa / BC

**Coloración gris (después de la cocción):** bastante sensible / 6

**Coloración en crudo:** ligeramente sensible / 7

**Calidad para patatas fritas:** excelente / 8

**Distribución de la materia seca:** buena / 7,5

**Calidad para chips:** buena / 7

**Nivel de TGA:** 3,4

Agrico ha adoptado todas las precauciones razonables para elaborar esta descripción de la variedad. Sin embargo, tenga en cuenta que cualquier información puede estar sujeta a cambios y Agrico no aceptará ninguna responsabilidad, en caso de errores u omisiones. En ninguna circunstancia Agrico será responsable de los daños que surjan de o estén relacionados con la información contenida en esta descripción.

AGRICO

RECOMENDACIONES DE CULTIVO

# How to grow

agricopotatoes.ces

## Fertilización [1]

**Nitrógeno:** recomendación estándar - 10%.Preferiblemente en tres aplicaciones, con el segundo tratamiento poco después de la tuberización.

**Fósforo:** recomendación estándar.

**Potasio:** recomendación estándar + 10%.

## Tratamiento de semilla

Una pregerminación adecuada después de quitar el brote apical puede dar un resultado positivo en la formación de los tubérculos.Quitar los brotes una vez es opcional.

## Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 plantas/ha)
35/55 mm: 33 cm (40.000 plantas/ha)
50/55 mm: 40 cm (33.000 plantas/ha)

[1] El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.

## Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, puede causar alguna reacción en el follaje, pero rara vez una reducción del rendimiento.

## Fungicidas

Se recomienda un programa de tratamientos preventivos contra el mildiu.

## Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos tres semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

## Temperatura de almacenamiento - Tiempo de almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 5 ºC. Para fines de transformación, no almacenar por debajo de los 7 ºC. Adecuada para el almacenamiento a medio plazo.

Say potato, say Agrico.

## Resistencias

**Virus del enrrollado:** ligeramente sensible / 7

**Virus - Yn:** ligeramente sensible / 7,5

**Virus - Yntn (tubérculo):** ligeramente sensible / 7

**Spraing (Manchas y/o círculos necróticos):** muy sensible / 4

**Mildiu de la hoja:** ligeramente sensible / 6,5

**Mildiu del tubérculo:** ligeramente sensible / 7

**Fusarium:** ligeramente a no sensible / 8

**Sarna común:** sensible / 5

**Sarna pulverulenta:** muy sensible / 3,5

**Antracnosis:** - / -

**Sarna verrugosa F1:** - / -

**Sarna verrugosa F6:** bastante sensible / 5

**Sarna verrugosa F18:** - / -

**Nematodo dorado Ro 1/4:** resistente / 9

**Nematodo dorado Ro 2/3:** - / -

**Nematodo blanco Pa 2:** - / -

**Nematodo blanco Pa 3:** - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.es