

Milva.

Variedad tardía de consumo, con una buena resistencia a la sarna común y un rendimiento muy alto.



**Al por
menor
Frescas**

- » **Tipo de cocción bastante harinoso**
- » **Tubérculos grandes**
- » **Tuberización alta**



Características

Características generales

Obtentor: Saatzucht Berding

Cruzamiento: NENA x DUNJA

Derechos de obtentor: 31-12-2028

Plántula: NKG 86-1158

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: tardía / 5

Color claro del brote: azul violeta / BV

Color de la flor: blanca / W

Número de bayas: muy alto / 4

Follaje - desarrollo inicial: bastante rápido / 7

Follaje - desarrollo final: bueno / 8

Follaje - firmeza: bastante firme / 7

Color de la piel: amarilla / Y

Color de la carne: amarilla / Y

Finura de la piel: buena / 7

Forma de los tubérculos: oval / O

Regularidad de la forma de los tubérculos: bastante irregular / 5

Tuberización: alta / 8

Tamaño de los tubérculos: bastante grande / 7,5

Regularidad del tamaño: bastante regular / 6,5

Dormancia: media / 6

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: bastante sensible / 6

Manchas negras (magulladuras internas): ligeramente sensible / 7

Grietas de crecimiento: bastante sensible / 6

Daños de recolección: sensible / 5

Metribuzina: ligeramente sensible a no sensible / 8

Metribuzina: ligeramente sensible a no sensible / 8

Etileno: - / -

Peso bajo agua: 380

Contenido de materia seca: 20,7%

Tipo de cocción: bastante harinosa / B

Coloración gris (después de la cocción): bastante sensible / 6,5

Coloración en crudo: bastante sensible / 6,5

Calidad para patatas fritas: inadecuada / 4

Distribución de la materia seca: - / -

Calidad para chips: inadecuada / 4

Nivel de TGA: 2,4


agricopotatoes.ces

Consejos de cultivo

Fertilización ¹

Nitrógeno: recomendación estándar + 10%.

Fósforo: recomendación estándar.

Potasio: recomendación estándar.

Tratamiento de semilla

Una pregerminación adecuada después de quitar el brote apical puede dar un resultado positivo en la formación de los tubérculos. Quitar los brotes más de una vez puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

Distancia de plantación

28/35 mm: 20 cm (67.000 plantas/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)

¹ El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.

Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, no causa ninguna reacción en el follaje, ni reducción del rendimiento.

Fungicidas

Es necesario un programa estricto de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Temperatura de almacenamiento - Tiempo de almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 5 °C. Adecuada para el almacenamiento a medio plazo.



Say potato,
say Agrico.

Resistencias

Virus del enrollado: ligeramente sensible / 7

Virus - Yn: ligeramente sensible / 6

Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente sensible / 6

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): sensible / 5

Mildiu de la hoja: muy sensible / 4,5

Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6

Fusarium: sensible / 5

Sarna común: ligeramente sensible / 7

Sarna pulverulenta: ligeramente sensible / 6

Antracnosis: - / -

Sarna verrugosa F1: - / -

Sarna verrugosa F6: - / -

Sarna verrugosa F18: - / -

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9

Nematodo dorado Ro 2/3: - / -

Nematodo blanco Pa 2: - / -

Nematodo blanco Pa 3: - / -