RECOMENDACIONES DE CULTIVO

# Twister.

Variedad semitemprana de consumo, para cultivo convencional y ecológico, con un buen rendimiento y resistente al mildiu de la hoja y del tubérculo.

- **Resistencia al mildiu**
- **Preciosa piel**
- **Buena capacidad de almacenamiento**
- **Gran resistencia a virosis**

Ecológico

Al por menor
Frescas

Tradicional




# Características

## Características generales

**Obtentor:** G.W. te Winkel
**Cruzamiento:** ARG 96-0739 x AR 02-9113
**Derechos de obtentor:** 31-12-2048
**Plántula:** TW 08-1507

## Características de la planta y del tubérculo

**Madurez:** semitemprana / 7
**Color claro del brote:** rojo violeta / RV
**Color de la flor:** morada clara / LP
**Número de bayas:** por encima de la media / 5,5
**Follaje - desarrollo inicial:** bastante rápido / 7
**Follaje - desarrollo final:** bastante bueno / 7,5
**Follaje - firmeza:** bastante firme / 7
**Color de la piel:** amarilla / Y
**Color de la carne:** amarilla clara / 6,5
**Finura de la piel:** buena / 7
**Forma de los tubérculos:** redondo oval / RO
**Regularidad de la forma de los tubérculos:** regular / 7
**Tuberización:** media / 6,5
**Tamaño de los tubérculos:** bastante grande / 7
**Regularidad del tamaño:** bastante regular / 6,5
**Dormancia:** bastante larga / 7

## Sensibilidad y calidad

**Crecimiento secundario:** bastante sensible / 6,5
**Manchas negras (magulladuras internas):** ligeramente sensible a no sensible / 8
**Grietas de crecimiento:** bastante sensible / 6,5
**Daños de recolección:** ligeramente sensible / 7
**Metribuzina:** muy sensible / 3
**Metribuzina:** muy sensible / 3
**Etileno:** 5% menos tubérculos / 4
**Peso bajo agua:** 345
**Contenido de materia seca:** 19%
**Tipo de cocción:** bastante firme / AB
**Coloración gris (después de la cocción):** bastante sensible / 6,5
**Coloración en crudo:** bastante sensible / 6
**Calidad para patatas fritas:** inadecuada / 5
**Distribución de la materia seca:** - / -
**Calidad para chips:** inadecuada / 4
**Nivel de TGA:** 5,63 mg/100g

Agrico ha adoptado todas las precauciones razonables para elaborar esta descripción de la variedad. Sin embargo, tenga en cuenta que cualquier información puede estar sujeta a cambios y Agrico no aceptará ninguna responsabilidad, en caso de errores u omisiones. En ninguna circunstancia Agrico será responsable de los daños que surjan de o estén relacionados con la información contenida en esta descripción.

AGRICO

RECOMENDACIONES DE CULTIVO

# Consejos de cultivo

agricopotatoes.ces

## Fertilización [1]

**Nitrógeno:** recomendación estándar + 20%.

**Fósforo:** recomendación estándar.

**Potasio:** recomendación estándar.

## Tratamiento de semilla

Puede plantarse directamente al salir de la cámara frigorífica, preferiblemente después de un breve acondicionamiento térmico de la semilla.Quitar los brotes una vez es opcional.

## Distancia de plantación

28/35 mm: 22 cm (60.500 plantas/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)

[1] El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.

## Malas hierbas

No usar metribuzina (Sencor) en post-emergencia, ya que causa una reacción grave en el follaje y una reducción importante del rendimiento.

## Fungicidas

A pesar de la resistencia al mildiu, hay que estar alerta a las infecciones.

## Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

## Temperatura de almacenamiento - Tiempo de almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 6 ºC. Adecuada para el almacenamiento a medio y largo plazo.



Say potato, say Agrico.

## Resistencias

**Virus del enrrollado:** - / -

**Virus - Yn:** ligeramente a no sensible / 8

**Virus - Yntn (tubérculo):** ligeramente a no sensible / 8

**Spraing (Manchas y/o círculos necróticos):** ligeramente sensible / 6

**Mildiu de la hoja:** ligeramente a no sensible / 9

**Mildiu del tubérculo:** ligeramente a no sensible / 9

**Fusarium:** ligeramente sensible / 6

**Sarna común:** ligeramente sensible / 6

**Sarna pulverulenta:** sensible / 5

**Antracnosis:** ligeramente sensible / 7

**Sarna verrugosa F1:** moderadamente sensible / 8

**Sarna verrugosa F6:** - / -

**Sarna verrugosa F18:** - / -

**Nematodo dorado Ro 1/4:** resistente / 9

**Nematodo dorado Ro 2/3:** - / -

**Nematodo blanco Pa 2:** - / -

**Nematodo blanco Pa 3:** - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.es