


Leonore (AR 13-1059).

Variedad temprana para frito, de buen rendimiento precoz y contenido de materia seca.

- ▶ **Temprana**
- ▶ **Buena resistencia a las virosis**
- ▶ **Tubérculos largo-ovales de piel fina**



Transformación Tradicional
Patatas fritas



characteristics

Características generales

Obtentor: Agrico Research B.V.

Cruzamiento: EXCELENCY x AR 06-3754

Plántula: AR 13-1059

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: temprana / 7,5

Color claro del brote: - / -

Color de la flor: blanca / W

Número de bayas: ninguno / 8

Follaje - desarrollo inicial: rápido / 8

Follaje - desarrollo final: bueno / 8

Follaje - firmeza: bastante firme / 7

Color de la piel: amarilla / Y

Color de la carne: amarilla / 7

Finura de la piel: buena / 7

Forma de los tubérculos: largo oval / LO

Regularidad de la forma de los tubérculos: bastante regular / 6

Tuberización: media / 6,5

Tamaño de los tubérculos: bastante grande / 7,5

Regularidad del tamaño: bastante regular / 6,5

Dormancia: media / 6

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: bastante sensible / 6,5

Manchas negras (magulladuras internas):
ligeramente sensible a no sensible / 8

Grietas de crecimiento: bastante sensible / 6,5

Daños de recolección: bastante sensible / 6,5

Metribuzina: bastante sensible / 6,5

Metribuzina: ligeramente sensible / 7

Bentazona: - / -

Etileno: 5% menos a 5% más tubérculos / 5

Peso bajo agua: 397

Contenido de materia seca: 21,5%

Tipo de cocción: harinosa / BC

Coloración gris (después de la cocción): ligeramente sensible / 7

Coloración en crudo: muy sensible / 4,5

Calidad para patatas fritas: buena / 7

Distribución de la materia seca: buena / 7,5

Calidad para chips: - / -

Nivel de TGA: 6,7



agricopotatoes.ces

How to grow

Fertilización ¹

Nitrógeno: recomendación estándar + 10%.

Fósforo: recomendación estándar.

Potasio: recomendación estándar.

Tratamiento de semilla

Quitar los brotes más de una vez puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

Planting distance

28/35 mm: 24 cm (55.000 plantas/ha)

35/55 mm: 31 cm (42.000 plantas/ha)

Leonore se plantará un poco más profunda que otras variedades para evitar el verdeo de los tubérculos.

¹ El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.

Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, puede causar alguna reacción en el follaje, pero rara vez una reducción del rendimiento.

Fungicidas

Es necesario un programa estricto de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Temperatura de almacenamiento - Tiempo de almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 7 °C. Adecuada para la entrega directa desde el campo o el almacenamiento a corto plazo.



**Say potato,
say Agrico.**

Resistencias

Virus del enrollado: - / -

Virus - Yn: ligeramente sensible / 7,5

Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente sensible / 6

Spraining (Manchas y/o círculos necróticos): sensible / 5,5

Mildiu de la hoja: muy sensible / 3,5

Mildiu del tubérculo: sensible / 5

Fusarium: ligeramente sensible / 6

Sarna común: ligeramente sensible / 6

Sarna pulverulenta: muy sensible / 3

Antracnosis: sensible / 5

Sarna verrugosa F1: resistente / 10

Sarna verrugosa F6: - / -

Sarna verrugosa F18: - / -

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9

Nematodo dorado Ro 2/3: - / -

Nematodo blanco Pa 2: - / -

Nematodo blanco Pa 3: - / -