RECOMENDACIONES DE CULTIVO

# Rudolph.

Variedad semitardía de consumo, con una atractiva piel roja, una buena tolerancia al calor y un rendimiento muy alto.

- **Carne blanca**
- **Tubérculos grandes**
- **Buena capacidad de almacenamiento**

Tradicional



# Características

## Características generales

**Obtentor:** Agrico Research B.V.

**Cruzamiento:** CHIEFTAIN x STIRLING

**Derechos de obtentor:** 31-12-2035

**Plántula:** UK 93-1-2

## Características de la planta y del tubérculo

**Madurez:** semitardía / 5,5

**Color claro del brote:** rojo violeta / RV

**Color de la flor:** morada clara / LP

**Número de bayas:** medio / 6

**Follaje - desarrollo inicial:** medio / 6

**Follaje - desarrollo final:** bueno / 8

**Follaje - firmeza:** firme / 8

**Color de la piel:** roja / R

**Color de la carne:** blanca / 4

**Finura de la piel:** buena / 7

**Forma de los tubérculos:** oval redondo / OR

**Regularidad de la forma de los tubérculos:** bastante regular / 6

**Tuberización:** bastante baja / 5

**Tamaño de los tubérculos:** grande / 8

**Regularidad del tamaño:** regular / 7

**Dormancia:** bastante larga / 7

## Sensibilidad y calidad

**Crecimiento secundario:** bastante sensible / 6,5

**Manchas negras (magulladuras internas):** ligeramente sensible / 7

**Grietas de crecimiento:** bastante sensible / 6

**Daños de recolección:** bastante sensible / 6

**Metribuzina:** ligeramente sensible a no sensible / 8

**Metribuzina:** ligeramente sensible / 7,5

**Etileno:** 5% a 15% más tubérculos / 6

**Peso bajo agua:** 376

**Contenido de materia seca:** 20,5%

**Tipo de cocción:** bastante firme / AB

**Coloración gris (después de la cocción):** bastante sensible / 6,5

**Coloración en crudo:** - / -

**Calidad para patatas fritas:** por encima de la media / 6,5

**Distribución de la materia seca:** - / -

**Calidad para chips:** por debajo de la media / 5,5

**Nivel de TGA:** 5,5 mg/100g

Agrico ha adoptado todas las precauciones razonables para elaborar esta descripción de la variedad. Sin embargo, tenga en cuenta que cualquier información puede estar sujeta a cambios y Agrico no aceptará ninguna responsabilidad, en caso de errores u omisiones. En ninguna circunstancia Agrico será responsable de los daños que surjan de o estén relacionados con la información contenida en esta descripción.

AGRICO

RECOMENDACIONES DE CULTIVO

# Consejos de cultivo

agricopotatoes.ces

## Fertilización [1]

**Nitrógeno:** recomendación estándar.Preferiblemente como aplicación fraccionada, con el segundo tratamiento poco después de la tuberización.

**Fósforo:** recomendación estándar.

**Potasio:** recomendación estándar + 10%.

## Tratamiento de semilla

Se recomienda un breve calentamiento de la semilla o una pregerminación adecuada.Una pregerminación adecuada después de quitar el brote apical puede dar un resultado positivo en la formación de los tubérculos.Quitar los brotes una vez es opcional.

## Distancia de plantación

28/35 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)
35/55 mm: 33 cm (40.000 plantas/ha)

[1] El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.

## Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, puede causar alguna reacción en el follaje y alguna reducción del rendimiento.

## Fungicidas

Es necesario un programa estricto de tratamientos preventivos contra el mildiu.

## Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos tres semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

## Temperatura de almacenamiento - Tiempo de almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 5 ºC. Adecuada para el almacenamiento a largo plazo.



Say potato, say Agrico.

## Resistencias

**Virus del enrrollado:** - / -

**Virus - Yn:** sensible / 5

**Virus - Yntn (tubérculo):** ligeramente sensible / 7

**Spraing (Manchas y/o círculos necróticos):** ligeramente sensible / 7

**Mildiu de la hoja:** sensible / 5,5

**Mildiu del tubérculo:** sensible / 5,5

**Fusarium:** ligeramente sensible / 6

**Sarna común:** sensible / 5

**Sarna pulverulenta:** ligeramente sensible / 7

**Antracnosis:** ligeramente sensible / 7

**Sarna verrugosa F1:** resistente / 10

**Sarna verrugosa F6:** moderadamente sensible / 8

**Sarna verrugosa F18:** - / -

**Nematodo dorado Ro 1/4:** - / -

**Nematodo dorado Ro 2/3:** - / -

**Nematodo blanco Pa 2:** - / -

**Nematodo blanco Pa 3:** - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.es