

Sante.

Variedad semitardía de consumo, con un buen rendimiento.

- ▶ **Alto contenido de materia seca**
- ▶ **Bastante harinosa**
- ▶ **Resistencia múltiple**



**Al por
menor**
Frescas



Tradicional



Características

Características generales

Obtendor: J. Vegter

Cruzamiento: WY 66-13-636 x AM 66-0042

Derechos de obtendor: Caducado

Plántula: VE 72-13-225

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: semitardía / 6

Color claro del brote: rojo violeta / RV

Color de la flor: blanca / W

Número de bayas: muy alto / 4

Follaje - desarrollo inicial: bastante rápido / 7

Follaje - desarrollo final: bastante bueno / 7,5

Follaje - firmeza: bastante firme / 7

Color de la piel: amarilla / Y

Color de la carne: amarilla clara / 6

Finura de la piel: media / 6

Forma de los tubérculos: oval redondo / OR

Regularidad de la forma de los tubérculos: bastante regular / 6

Tuberización: bastante alta / 7

Tamaño de los tubérculos: bastante grande / 7

Regularidad del tamaño: bastante regular / 6,5

Dormancia: media / 6

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: bastante sensible / 6,5

Manchas negras (magulladuras internas):
ligeramente sensible / 7,5

Grietas de crecimiento: bastante sensible / 6,5

Daños de recolección: bastante sensible / 6

Metribuzina: bastante sensible / 6

Metribuzina: ligeramente sensible / 7

Etileno: - / -

Peso bajo agua: 425

Contenido de materia seca: 22,9%

Tipo de cocción: bastante harinosa / B

Coloración gris (después de la cocción): sensible / 5,5

Coloración en crudo: - / -

Calidad para patatas fritas: media / 6

Distribución de la materia seca: - / -

Calidad para chips: inadecuada / 5

Nivel de TGA: 3,9

Consejos de cultivo



agricopotatoes.ces

Fertilización ¹

Nitrógeno: recomendación estándar.

Fósforo: recomendación estándar.

Potasio: recomendación estándar.

Tratamiento de semilla

Una pregerminación adecuada después de quitar el brote apical puede dar un resultado positivo en la formación de los tubérculos. Quitar los brotes más de una vez puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

Distancia de plantación

28/35 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 plantas/ha)

¹ El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.

Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, puede causar alguna reacción en el follaje y alguna reducción del rendimiento.

Fungicidas

Es necesario un programa estricto de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Temperatura de almacenamiento - Tiempo de almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 5 °C. Adecuada para el almacenamiento a medio plazo.



Resistencias

Virus del enrollado: ligeramente sensible / 7

Virus - Yn: ligeramente a no sensible / 8,5

Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente a no sensible / 9

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): ligeramente sensible / 6

Mildiu de la hoja: sensible / 5

Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7

Fusarium: ligeramente sensible / 6

Sarna común: sensible / 5

**Say potato,
say Agrico.**

Sarna pulverulenta: ligeramente a no sensible / 8

Antracnosis: sensible / 5,5

Sarna verrugosa F1: resistente / 10

Sarna verrugosa F6: - / -

Sarna verrugosa F18: - / -

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9

Nematodo dorado Ro 2/3: resistencia de campo / 7

Nematodo blanco Pa 2: resistencia de campo / 7

Nematodo blanco Pa 3: sensible / 3