

Jamaica.

Variedad temprana -tradicional y al por menor- con bonita piel y buen tamaño.



**Al por
menor**
Frescas



Tradicional

- ▶ Buena producción
- ▶ Bonita piel
- ▶ Buen tamaño

Image:

Características

Características generales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: OS 07-0020 x SAVIOLA
Derechos de obtentor: Pendiente
Plántula: AR 14-0334

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: temprana / 7,5
Color claro del brote: - / -
Color de la flor: blanca / W
Número de bayas: por encima de la media / 5
Follaje - desarrollo inicial: rápido / 8
Follaje - desarrollo final: bastante bueno / 7,5
Follaje - firmeza: media / 6,5
Color de la piel: amarilla / Y
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: buena / 7
Forma de los tubérculos: oval largo / OL
Regularidad de la forma de los tubérculos: regular / 7
Tuberización: media / 6
Tamaño de los tubérculos: grande / 8
Regularidad del tamaño: regular / 7
Dormancia: bastante corta / 5,5

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: bastante sensible / 6,5
Manchas negras (magulladuras internas):
ligeramente sensible a no sensible / 8
Grietas de crecimiento: bastante sensible / 6,5
Daños de recolección: bastante sensible / 6
Metribuzina: muy sensible / 3
Metribuzina: muy sensible / 3
Bentazona: - / -
Etileno: - / -
Peso bajo agua: 332
Contenido de materia seca: 18,3%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Coloración gris (después de la cocción): - / -
Coloración en crudo: - / -
Calidad para patatas fritas: - / -
Distribución de la materia seca: - / -
Calidad para chips: - / -
Nivel de TGA: 15 mg/100g
Aceite de carvona: - / -



Consejos de cultivo

Fertilización ¹

Nitrógeno: recomendación estándar. Preferiblemente como aplicación fraccionada, con el segundo tratamiento poco después de la tuberización.

Fósforo: recomendación estándar.

Potasio: recomendación estándar.

Tratamiento de semilla

Se recomienda un breve calentamiento de la semilla o una pregerminación adecuada.

Distancia de plantación

28/35 mm: 20 cm (67.000 plants/ha)

35/50 mm: 27 cm (50.000 plants/ha)

Malas hierbas

No usar metribuzina (Sencor) en post-emergencia, ya que causa una reacción grave en el follaje y una reducción importante del rendimiento.

Fungicidas

Es necesario un programa estricto de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Temperatura de almacenamiento - Tiempo de almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 4 °C. Adecuada para la entrega directa desde el campo o el almacenamiento a corto plazo.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Resistencias

Virus del enrollado: - / -

Virus - Yn: ligeramente a no sensible / 8

Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente sensible / 6

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): ligeramente sensible / 6,5

Mildiu de la hoja: muy sensible / 3,5

Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6

Fusarium: - / -

Sarna común: sensible / 5,5

Sarna pulverulenta: - / -

Antracnosis: - / -

Sarna verrugosa F1: resistente* / 10*

Sarna verrugosa F6: - / -

Sarna verrugosa F18: - / -

Nematodo dorado Ro 1/4: sensible* / 1*

Nematodo dorado Ro 2/3: - / -

R_Golden nematode Ro 5: - / -

Nematodo blanco Pa 2: - / -

Nematodo blanco Pa 3: - / -