

Texas.



Transformación
Patatas fritas

Variedad tardía de alto rendimiento, para la industria de french fries, apta para el cultivo en diferentes tipos de suelo.

Image:

- » **Alta producción**
- » **Alto contenido de materia seca**
- » **Múltiples resistencia a la sarna verrugosa**

Características

Características generales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: LEANDRA x AR 07-4113
Derechos de obtentor: Pendiente
Plántula: AR 14-3488

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: semitardía / 5,5
Color claro del brote: - / -
Color de la flor: blanca / W
Número de bayas: medio / 6
Follaje - desarrollo inicial: bastante rápido / 7,5
Follaje - desarrollo final: bueno / 8
Follaje - firmeza: bastante firme / 7,5
Color de la piel: amarilla / Y
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: por debajo de la media / 5,5
Forma de los tubérculos: oval largo / OL
Regularidad de la forma de los tubérculos: regular / 7
Tuberización: media / 6
Tamaño de los tubérculos: bastante grande / 7,5
Regularidad del tamaño: bastante regular / 6,5
Dormancia: media / 6

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: bastante sensible / 6,5
Manchas negras (magulladuras internas): bastante sensible / 6,5
Grietas de crecimiento: bastante sensible / 6,5
Daños de recolección: sensible / 5
Metribuzina: ligeramente sensible / 7
Metribuzina: ligeramente sensible / 7,5
Bentazona: - / -
Etileno: - / -
Peso bajo agua: 427
Contenido de materia seca: 23%
Tipo de cocción: harinosa / C
Coloración gris (después de la cocción): ligeramente sensible / 7,5
Coloración en crudo: muy sensible / 4,5
Calidad para patatas fritas: buena / 7
Distribución de la materia seca: media / 6,5
Calidad para chips: - / -
Nivel de TGA: -
Aceite de carvona: - / -



Consejos de cultivo

Fertilización ¹

Nitrógeno: recomendación estándar. Preferiblemente como aplicación fraccionada, con el segundo tratamiento poco después de la tuberización.

Fósforo: recomendación estándar.

Potasio: recomendación estándar.

Tratamiento de semilla

Se recomienda un breve calentamiento de la semilla o una pregerminación adecuada. Puede plantarse directamente al salir de la cámara frigorífica, preferiblemente después de un breve acondicionamiento térmico de la semilla.

Distancia de plantación

Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Resistencias

Virus del enrollado: - / -

Virus - Yn: ligeramente sensible / 6,5

Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente sensible / 6

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): muy sensible / 4,5

Mildiu de la hoja: muy sensible / 4

Mildiu del tubérculo: sensible / 5,5

Fusarium: - / -

Sarna común: sensible / 5,5

Sarna pulverulenta: - / -

Antracnosis: - / -

Sarna verrugosa F1: resistente / 10

Sarna verrugosa F6: resistente* / 10*

Sarna verrugosa F18: resistente / 10

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9

Nematodo dorado Ro 2/3: - / -

R_Golden nematode Ro 5: - / -

Nematodo blanco Pa 2: - / -

Nematodo blanco Pa 3: - / -