

Oregon.



Transformación
Patatas fritas de
bolsa (chips)

Variedad tardía para chips, regular en la forma y tamaño de los tubérculos y buen contenido de materia seca.

Image:

- ▶ **Forma y tamaño regulares**
- ▶ **Buena calidad para chips, incluso tras un almacenamiento prolongado**
- ▶ **Pocos defectos en los tubérculos**

Características

Características generales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: LEANDRA x VR 808
Derechos de obtentor: Pendiente
Plántula: AR 14-3578

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: tardía / 5
Color claro del brote: - / -
Color de la flor: morada clara / LP
Número de bayas: - / -
Follaje - desarrollo inicial: bastante rápido / 7
Follaje - desarrollo final: bueno / 8
Follaje - firmeza: bastante firme / 7,5
Color de la piel: amarilla / Y
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: por debajo de la media / 5,5
Forma de los tubérculos: oval redondo / OR
Regularidad de la forma de los tubérculos: bastante regular / 6,5
Tuberización: media / 6
Tamaño de los tubérculos: bastante grande / 7,5
Regularidad del tamaño: regular / 7
Dormancia: media / 6,5

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: bastante sensible / 6
Manchas negras (magulladuras internas): ligeramente sensible / 7
Grietas de crecimiento: bastante sensible / 6,5
Daños de recolección: sensible / 5
Metribuzina: ligeramente sensible / 7
Metribuzina: ligeramente sensible / 7,5
Bentazona: - / -
Etileno: - / -
Peso bajo agua: 465
Contenido de materia seca: 24,9%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Coloración gris (después de la cocción): sensible / 5
Coloración en crudo: bastante sensible / 6,5
Calidad para patatas fritas: por encima de la media / 6,5
Distribución de la materia seca: bastante deficiente / 5
Calidad para chips: buena / 7
Nivel de TGA: -
Aceite de carvona: - / -



Consejos de cultivo

Fertilización ¹

Nitrógeno: recomendación estándar. Preferiblemente en tres aplicaciones, con el segundo tratamiento poco después de la tuberización.

Fósforo: recomendación estándar.

Potasio: recomendación estándar + 10%.

Tratamiento de semilla

Es preferible sembrar los tubérculos en un suelo caliente, ya que el desarrollo inicial de esta variedad es lento.

Distancia de plantación

30/50 mm: 30 cm (45.000 plants/ha)

Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, puede causar alguna reacción en el follaje, pero rara vez una reducción del rendimiento.

Fungicidas

Es necesario un programa estricto de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Temperatura de almacenamiento - Tiempo de almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 9 °C. Adecuada para el almacenamiento a medio y largo plazo.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Resistencias

Virus del enrollado: - / -

Virus - Yn: ligeramente a no sensible / 8

Virus - Yntn (tubérculo): - / -

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): sensible / 5

Mildiu de la hoja: muy sensible / 4,5

Mildiu del tubérculo: sensible / 5

Fusarium: - / -

Sarna común: ligeramente sensible / 6,5

Sarna pulverulenta: - / -

Antracnosis: - / -

Sarna verrugosa F1: muy sensible* / 1*

Sarna verrugosa F6: muy sensible* / 1*

Sarna verrugosa F18: - / -

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9

Nematodo dorado Ro 2/3: - / -

R_Golden nematode Ro 5: - / -

Nematodo blanco Pa 2: - / -

Nematodo blanco Pa 3: - / -