
CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Paradiso.

Variedad semitardía con grandes tubérculos y con un excelente rendimiento para el mercado tradicional.

- **Aspecto excelente**
- **Alto rendimiento**
- **Follaje firme**
- **Fuerte crecimiento**

Tradicional



Características

Características generales

Obtentor: M. Pot & M. Klaver

Cruzamiento: RODEO x VALOR

Derechos de obtentor: 31-12-2048

Plántula: PK 06-0108

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: semitardía / 6

Color claro del brote: rojo / R

Color de la flor: morada / P

Número de bayas: por debajo de la media / 6,5

Follaje - desarrollo inicial: bastante rápido / 7,5

Follaje - desarrollo final: bastante bueno / 7,5

Follaje - firmeza: bastante firme / 7

Color de la piel: amarilla / Y

Color de la carne: amarilla clara / 6

Finura de la piel: buena / 7

Forma de los tubérculos: oval largo / OL

Regularidad de la forma de los tubérculos: bastante regular / 6,5

Tuberización: media / 6

Tamaño de los tubérculos: grande / 8

Regularidad del tamaño: bastante regular / 6,5

Dormancia: media / 6

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: ligeramente sensible / 7

Manchas negras (magulladuras internas): ligeramente sensible / 7,5

Grietas de crecimiento: bastante sensible / 6,5

Daños de recolección: bastante sensible / 6,5

Metribuzina: ligeramente sensible a no sensible / 8

Metribuzina: bastante sensible / 6,5

Bentazona: bastante sensible / 6,5

Etileno: 5% a 15% más tubérculos / 6

Peso bajo agua: 329

Contenido de materia seca: 18,2%

Tipo de cocción: bastante harinosa / B

Coloración gris (después de la cocción): bastante sensible / 6,5

Coloración en crudo: - / -

Calidad para patatas fritas: inadecuada / 4,5

Distribución de la materia seca: - / -

Calidad para chips: inadecuada / 4

Nivel de TGA: 4,8 mg/100g

Aceite de carvona: 5% menos tubérculos / 4

Tasa de mutación: Esta variedad puede presentar una alta tasa de mutación. Por lo tanto, se desaconseja el uso de aceite de carvona. / Use of carvone oil can provoke mutations.

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

AGRICO

CULTIVATION RECOMMENDATION

Consejos de cultivo

Fertilización [1]

Nitrógeno: recomendación estándar - 20%.Preferiblemente como aplicación fraccionada, con el segundo tratamiento poco después de la tuberización.

Fósforo: recomendación estándar.

Potasio: recomendación estándar.

Tratamiento de semilla

Quitar los brotes puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

Distancia de plantación

28/35 mm: 23 cm (58.000 plantas/ha)
35/55 mm: 33 cm (40.000 plantas/ha)

Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, no causa ninguna reacción en el follaje, ni reducción del rendimiento.

Fungicidas

Se recomienda un programa de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Temperatura de almacenamiento - Tiempo de almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 4 ºC. Adecuada para el almacenamiento a medio plazo.



Say potato, say Agrico.

Resistencias

Virus del enrrollado: - / -

Virus - Yn: ligeramente sensible / 6

Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente sensible / 7,5

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): muy sensible / 4

Mildiu de la hoja: sensible / 5,5

Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6,5

Fusarium: sensible / 5

Sarna común: sensible / 5,5

Sarna pulverulenta: ligeramente sensible / 7,5

Antracnosis: sensible / 5,5

Sarna verrugosa F1: resistente / 10

Sarna verrugosa F6: - / -

Sarna verrugosa F18: - / -

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9

Nematodo dorado Ro 2/3: - / -

Nematodo blanco Pa 2: - / -

Nematodo blanco Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com