

Alouette.

Varhainen pääsatolajike, monipuolinen punakuorinen lajike, jonka lehdet ja mukulat kestävät myöhäistä ruttoa ja joka soveltuu tavanomaiseen ja luonnonmukaiseen tuotantoon.

- » Hyvä sietokyky mustelmia vastaan
- » Sopii ruoanlaittoon ja kotileivonnaisiin
- » Hyvä kuivuuden sietokyky



Luomu



Vähittäiskauppa
Pakkaus



Kuori



Ominaisuudet

Yleiset ominaisuudet

Jalostaja: Agrico Research B.V.
Jalostaja: AR 02-139-1 x LAURA
Jalostajan oikeudet: 31-12-2044
Taimi: AR 04-3153

Kasvin ja mukulan ominaisuudet

Kypsyys: aikainen pääsato / 6
Vaalea version väri: punainen violetti / RV
Kukkien väri: vaalean violetti / LP
Marjojen lukumäärä: erittäin korkea / 4
Lehdet - alkukehitys: nopea / 8
Lehdet - lopullinen kehitys: hyvä / 8
Lehtipinta: melko kiinteä / 7,5
Väri: punainen / R
Lihan väri: keltainen / 7,5
Kuorilaatu: hyvä / 7
Mukulan muoto: soikea pitkä / OL
Mukulan muodon säännöllisyys: tavanomainen / 7
Tuberisointi: keskiarvo / 6
Mukulan koko: melko suuri / 7
Koon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5
Lepotila: keskiarvo / 6

Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6,5
Musta piste (sisäinen mustelma): hieman tai ei herkkä / 8
Kasvuhalkeamat: melko herkkä / 6,5
Sadonkorjuuvauriot: melko herkkä / 6
Metribuzin: hieman herkkä / 7,5
Metribuzin: hieman herkkä / 7
Bentazon: hieman herkkä / 7
Etyleen: 5 % vähemmän mukuloita / 4
Vedenalainen paino: 389
Kuiva-ainepitoisuus: 21,1%
Keittolaatu: melko kiinteä / AB
Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): hieman herkkä / 7
Raakatummuminen: hieman herkkä / 7
Ranskalaisten laatu: keskimääräistä parempi / 6,5
Kuiva-aineen jakautuminen: - / -
Prosessi laatu: - / -
TGA-taso: 3,6

Viljelyohjeet



www.agricopotatoes.fi

Lannoitus ¹

Typpi: normi + 10 %.

Fosfori: normi.

Kalium: normi + 20 %.

Siementen käsittely

Istuta mukulat mieluiten lämpimään maahan, sillä lajikkeen alkukehitys on hidasta. Asianmukainen esiidätys ylimmän version poistamisen jälkeen voi vaikuttaa myönteisesti mukuloiden kasvuun. Useammin kuin kerran tapahtuvalla idunpoistolla voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

Istutusetäisyys

28/35 mm: 20 cm (67.000 taimia/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 taimia/ha)

Rikkaruohot

Metributsiinin (Sencor) tavanomainen käyttö ei aiheuta lehtien reaktioita tai sadon vähenemistä.

Sienitautien torjunta-aineet

Huolimatta perunaruton vastustuskyvystä, pysy valppaana tartuntojen varalta.

Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suosittelava säilytyslämpötila on 5 °C. Älä säilytä käsittelyä varten alle 7 °C. Soveltuu keskipitkään säilytykseen.



Kestävyydet

Virus - Leaf roll: - / -

Virus - Yn: hieman tai ei herkkä / 8

Virus - Yntn (mukula): hieman altis / 7

Ruoste: altis / 5,5

Perunarutto - varsisto: hieman tai ei herkkä / 9

Perunarutto - mukula: hieman tai ei herkkä / 9

Fusarium: hieman altis / 7,5

Tavanomaninen rupi: hieman altis / 6

Say potato,
say **Agrico.**

Kuorirokko: hieman altis / 6,5

Musta piste: - / -

Syylätauti F1: kestävä / 10

Syylätauti F6: - / -

Syylätauti F18: - / -

Keltainen ankeroinen Ro 1/4: kestävä / 9

Keltainen ankeroinen Ro 2/3: kenttäkestävä / 8

Valkoinen ankeroinen Pa 2: - / -

Valkoinen ankeroinen Pa 3: - / -